

# دفع حساسات علاج



کتب خانہ طیب

## انٹرمیڈیٹ ٹیچنگ

از قلم: ڈاکٹر بشیر الدین عھری

رسالہ مغربی طب میرٹھ

ایڈیٹر: رسالہ شفا سیات جدیدہ میرٹھ

مصنف: قرطاس مجربات جیسی امراض النساء، جیسی عمل

اشرب جلدی امراض کا علاج، جدید ڈاکٹری کتاب العلاج

علاج عھری، علاج بالجوہر غد، سلفا ادویات، فارماکوپیا

مبئی ہسپتال، رسالہ ٹیرامانی، سین سیبا علاج بالادوی

پہلا ایڈیشن ۱۹۵۶ء

ناشرین

کامز ایسٹریٹوٹ آف میڈیسن میرٹھ (یوپی)

قیمت فی جلد دو روپے

پہلی اشاعت ایک ہزار

# کاپی رائٹ ۱۹۵۶ء

از کامیاب انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن میرٹھ شہر  
مطبوعہ یونین پرنٹنگ پریس دہلی

عالمین طب و طباطب کے لئے ایک مختصر طبی کتب خانہ

- ۱۔ جدید ڈاکٹری کتاب العلاج حصہ اول مجلد سنہری موسم سرما ۱۹۵۵ء قیمت دو روپے آٹھ آنے
- ۲۔ علاج عصری حصہ اول مجلد سنہری موسم برسات ۱۹۵۵ء قیمت دو روپے آٹھ آنے
- ۳۔ علاج بالانجورہ قد (ہارمون تھیراپی) مجلد موسم گرما ۱۹۵۵ء دو روپے
- ۴۔ فارماکوپیا بمبئی ہسپتال مجلد موسم سرما ۱۹۵۵ء تین روپے
- ۵۔ جی بی ایل اشراپ (انجکشن تھیراپی) غیر مجلد ۱۹۵۴ء پانچ روپے
- ۶۔ جی بی ایل اشراپ النساء (گائٹے کو بوجی) غیر مجلد موسم سرما ۱۹۵۴ء چار روپے
- ۷۔ جلدی امراض کا علاج مجلد جنوری ۱۹۵۴ء دو روپے
- ۸۔ سلفا ادویات (سلفا ڈرگز) مجلد جنوری ۱۹۵۵ء دو روپے

یہ تمام کتابیں جدید طریقہ تعلیم کے مطابق تیار کی گئی ہیں  
کامیاب انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن میرٹھ شہر

# پیش لفظ

اس مختصر کتاب میں دافع حساسیت ادویات ان کے صفات، کیمیاوی ترکیب، معتدلی اشارات علاج اور تجارتی مرکبات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔  
انٹی ہسٹامین ادویات زمانہ جدید میں شفا نیات میں ایک اہم مقام حاصل کر چکی ہیں اور سلفا ادویات انٹی بیوٹک ادویات احیائی تین بارہون مرکبات اور ہارمون ترکی طرح ایک عظیم کیمیا تسلیم کر لی گئی ہیں۔

لہذا اردو طب میں ادویات کی اس عظیم دموثر حلقہ کو پیش کرنے کے لئے یہ اہم معالجاتی کتاب تیار کی گئی ہے اس میں چھپنے دیکھنے معالجاتی کتب مثلاً د ہارمون تھیراپی، سلفا ڈاکٹری تھیراپی اور انٹی بیوٹک تھیراپی کے عنوان کی حیثیت سے پوری ذمہ داری کے ساتھ مخطوطات فراہم کر دی کر دی ہیں۔

امید ہے یہ کتاب طلباء طب، عالمین طب اور دیگر ناظرین کرام کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی اور اس کے متعلق جدید رایوں اور نکتہ چینیوں پر پوری توجہ دی جائیگی۔  
آخر میں خدا سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو ضرورت مند حضرات کے لئے کامیاب بنا دے۔ آمین

خادم طب

ڈاکٹر بشیر الدین عصری  
میرٹھ

۹ مارچ ۱۹۵۵ء

حکیم علی ضیاء احمد



## جدول مضامین

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۵	پیش لفظ	۱
۶	جدول مضامین	۲
۸	تاریخی شواہد	۳
۹	اٹلی ہٹلر کی تقریریں	۴
۱۲	ہٹلر کے برخلاف اثر اخذ عوامل	۵
۲۶	اٹلی ہٹلر ادبیات کے افعال	۶
	زہر پلے رد عمل	۷
	ناخوشگوار مختلف اثرات	۸
	معالجائی استعمالات اور اشکالات علاج	۸

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۵۱	اٹلی ہٹلر نوجوانیات	۹
۵۲	قراہادی مرکبات	۱۰
۵۴	حوالہ جات	۱۱
۵۶	اٹلی ہٹلر ادبیات ان کے تجارتی نام	۱۲
	حساسیتی نسل اور	۱۳
۵۸	ان کا دافع حساسیت علاج	
۸۳	اشارہ پر اردو امرات	۱۴

حکیم علی ضیاء احمد







## ۴۔ انٹی ہسٹامین کی تعریف

انٹی ہسٹامین Antihistamine یہ لفظ دو جملوں سے مرکب ہے۔

انٹی یعنی مضاد، مخالف، برعکس اور ہسٹامین یعنی لیج کا وہ مادہ جو جراثیمی یا فطوری اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے  
لیں انٹی ہسٹامین وہ دوا ہے جو ہسٹامین کے اثر کے خلاف کام کرے۔  
ہسٹامین کیا ہے؟

یہ ایک ایمائن (مادہ) ہے جو تمام حیوانی یا فطوری اور سبزیوں کی بافتوں میں واقع ہوتا ہے۔  
یہ مادہ عروق شریہ (باریک ہال ایسی رگوں) کو بہت زبردست کشادہ کرنے والا ہے اور افراط  
معدہ و رطوبت معدہ کا محرک ہے۔ اس لئے یہ معدے کے فعل کو جانچنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دوران  
خون کی سرعت کو بھی طو کرتا ہے اور یہ بعض مخصوص عصبانی خلیوں کو بھی جانچنے کے کام آتا ہے۔  
ہسٹامین گرد عروق، مریض کے معالجات، گھٹیا، جوڑوں کے پھرا جانے اور مریض کے مریض (دوا دوسرا  
بھی استعمال کی جاتی ہے اور مقامی طور پر قرص آکڑیں استعمال کی جاتی ہے اور بذریعہ اشرباب بھی استعمال  
کی جاتی ہے۔

ہسٹامین ہر وٹین کی خستہ حالت اور گندے عضویات میں بھی پائی جاتی ہے اور کئی قدر آنتوں کے  
اندرونی حصے میں پائی جاتی ہے گے سب کو سنت میں اس کا وجود ہوتا ہے اور اگر گتے کے مرکبات سے اس  
کو نکالا جاتا ہے یہ تمام بافتوں میں پائی جاتی ہے اور زیادہ مقدار میں پھیپھڑوں میں موجود ہوتی ہے اور یہ  
ذرات میں بھی پائی جاتی ہے۔  
ہسٹامین کا فعل :-

ہسٹامین مرکزی نظام عصبی کو کسی قدر دبا دیتی ہے اور دوران خون پر قابض اثر کرتی ہے مریضین  
کو سکیر دیتی ہے اور خون کا دباؤ بڑھاتی ہے اور پھر عروق شریہ کی کشادگی کے ساتھ دباؤ گر جاتا ہے اور  
اس طرح ایک حد تک اس کی حالت پیدا ہو جاتی ہے جو دل پر ناکافی خون کی رسد اور دوران خون کی کمی  
جانب خون نہ پہنچنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے پھیپھڑوں کی دھوی کو ٹھریاں سکر جاتی ہیں اور دوران خون میں  
ایک دوسرا غلغلہ واقع ہو جاتا ہے۔

حکیم  
علی  
ضیاء احمد

تفصیل پر اس کا اثر کم ہوتا ہے لیکن دم گھٹنے کی شکایت منجھ کے عضلہ ہسٹائین کے اثر کے سبب ہوتی ہے۔ ہسٹائین معدہ، آنتوں، اور رحم پر بھی انقباضی اثر کرتی ہے اور ان میں رنج پیدا کر سکتی ہے اور یہ اثر اگر سب سے بھی دور نہیں ہوتا رحم پر ہسٹائین کا اثر بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔  
یہ آنکھوں کے پوٹوں کو سکڑ دیتی ہے اور عروق شریہ کی رقت پذیری پیدا کر دیتی ہے اور خون کے کیمیائی اجزاء مثلاً کلسیم، فاسفیٹ، فیبرلجی، نائٹروجن اور شکر خون میں بڑھا دیا کرتی ہے اور ان تغیرات سے خون کا ہمارا بڑھ جاتا ہے۔

ہسٹائین سے بہت سے غدود مثلاً معالی، معدی، منقراسی، اور آسنوں والے غدود بھی افزا پیدا کر لگتے ہیں۔ اور اس کا یہ اثر آٹروپین سے کم کیا جاسکتا ہے۔

ہسٹائین اثرات کے اثر سے بافتوں میں تقم ہو جاتی ہے اور وہ ادھ ہسٹائین کی تیز کھانا ہے جو بہت سے اعضا اور بافتوں میں پایا جاتا ہے اور یہ مادہ کافی مقدار میں آنتوں اور گردوں میں پایا جاتا ہے۔ کچھ کے دل و کچھ کا کوئی مرکب ہسٹائین کی اس عظیم مقدار کو بے اثر کر سکتا ہے۔

ہسٹائین جلد پر لگانے سے خراش اور درد پیدا کر دیتی ہے اور رگوں کو کھول دیتی ہے، شریہ دم اور جلد میں آب خون کا رساؤ پیدا کر دیتی ہے اس مقامی رد عمل کا سبب اس کا سنہ گنا اثر ہے جو دو دن خون، رحم اور جلد پر ہوتا ہے۔

ہسٹائین کا مخصوص فعل یہ ہے کہ غیر مخطوط عضلہ کا زبردست انقباض پیدا ہو جاتا ہے اور یہ رحم میں خوب نمایاں ہوتا ہے۔ بعض جانوروں کے شعبہ جات میں ایسا زیادہ ہوتا ہے، خرگوش کی اندام ہنسی اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔

ہسٹائین کے ذریعے بنی کی علامات :- اس کا یہ نہر لایا اثر اگر گٹ کے استعمال سے فن ولادت میں دیکھا گیا ہے۔ جب کہ انجمن کے مقام پر رحم اور بافتوں کا ارتشاح پیدا ہو جاتا ہے۔ خراش جلد اور دبا سے درد محسوس ہونے لگتا ہے۔

درد سر، دباؤ، چہرے کا پھیرنا اور سر کا بھاری ہونا اس کی عام عید گیاں ہیں، ملحقہ چشم خون سے مبر جاتا ہے اور درد ناک ہو جاتا ہے، اسائن ٹکی سے آنے لگتا ہے اور جبکہ ارتشاح فانی ہوتا ہے تب تک مٹ جاتا ہے اور معدہ بہت کچھ سکڑ جاتا ہے۔ فیض تیز ہو کر خون کا دباؤ گر جاتا ہے آخر میں صدمہ سقوط قوت

ہو جاتی ہے خون کا دباؤ ۱۹ تا ۱۰۰ ایم ایم سے ۸۰ تا ۳۰ ایم ایم تک ہو جاتا ہے بڑی مقدار میں استعمال کرنے کو دل کی بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے۔

ہسٹائین کا دونوں دریدی انجکشن ۰.۲ ملی گرام فی منٹ کرنے سے خون کے دباؤ میں تغیر نہ ہونے ہوتا بلکہ کشادگی عروق کے ساتھ دل کے منظر میں زیادہ خوبصورت پیدا ہو جاتی ہے خون کے دباؤ میں گراؤ ہو جاتا ہے جو آنتوں کی رگوں کی کشادگی کے سبب ہوتا ہے گردہ کی دھوی کو ٹھہراں سکڑ جاتی ہیں۔  
معالجائی استعمال :- ہسٹائین کے دو اہم استعمال ہیں :-

(ا) محرک افزا معدہ

(ب) بطور شخص معدہ

ہسٹائین طب جدید میں بہت کم استعمال کی جاتی ہے یہ افزا معدہ میں تغیر پیدا کرتی ہے اور ریب معدہ کے ٹرنز جز کو بڑھا دیتی ہے اور بطور عال شخص صادق و کا ذب کیلوس کو جانچنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اور اس طرح یہ ایک بہت موثر عامل ہے جو شاذ و زیادہ یا کم مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔

بعض مخصوص مریضوں میں اس کے استعمال سے ناخوشگوار علامات مثلاً شدید کین پی کا درد سر اور سینہ میں زجر صدر یہ جیسا درد پیدا ہو جاتا ہے۔ چہرہ کبودی یافتہ پڑ جاتا ہے اور آنکھ کی بصارت ماند پڑ جاتی ہے۔ خون کا دباؤ بہت جلد گر جاتا ہے ہسٹائین کی عام متاد تحت جلدی راہ سے ۳ تا ۵ ملی گرام ہے۔ اکثر گرام جسمانی وزن پر ۱ ملی گرام متاد غالباً زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہسٹائین ایڈر فاسفیٹ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو عام طور پر بطور شراب دستیاب ہوتا ہے۔

بہ نادر مل سیلان میں بھی ص کر کے استعمال کیا جاسکتا ہے

ہسٹائین درد سر کا علاج :-

ہسٹائین اس میں بھی بطور دوا کے استعمال کی گئی ہے اور حساسیت خوار ہیں بھی مفید ہے۔ لیکن حالات میں یہ عطائی علاج ہے اور ابھی زیر حور ہے۔

ہسٹائین بافتوں میں داخل کر کے بھی استعمال کی جاتی ہے اور گرد عروق مرض اور گٹھائی الٹیہا متعل میں استعمال کی گئی ہے۔

ہسٹائین دوران خون کی سرعت کو بھی گٹ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور ۱ ملی گرام کا





## ۵۔ ہسٹامین کے برخلاف اثر انداز عوامل

Histamine Antagonizing Agents

Antihistamine Drugs

انٹی ہسٹامین ادویات :-

سب سے پہلے ۱۹۳۶ء میں پاجیرانسی ٹوٹ آف پیرس میں ڈاکٹر فریو اور بوٹ نے اپنے رھائے کا کے ساتھ زبردست قوی تاثیر انٹی ہسٹامین ادویات کا انکشاف کیا۔ انھوں نے انٹی اورینالین ادویات سے دلچسپی لی اور معلوم کیا کہ یہ مادے انٹی ہسٹامین اثر بھی رکھتے ہیں ان مادوں میں سب سے پہلے ۱۵،۵ ایف مادے پر توجہ دی گئی اور یہ سب سے موثر مادہ تھا اس کو ڈاکٹر اسٹوب نے بتلایا کہ یہ سویر میں پیدا شدہ ہسٹامین صدمے کی علامات کو رفع کرتے ہیں بہت موثر ہے پھر ۱۹۳۹ء میں ۱۵،۵ ایف ہزائل مادہ شفا یات مرکب ہے ان مرکبات کی سمیت سے ان کا استعمال شفا یات میں زیادہ دن نہ رہ سکا لیکن ۱۹۴۲ء میں ڈاکٹر ہال پر نے ان مرکبات کا مطالعہ جاری رکھا اور ۱۵،۵ ایف ہزائل مادہ شفا یات میں شامل کیا یہی مادہ جدید طب میں انٹرگان کہلاتا ہے جو بعد ازاں نیوانٹرگان کی شکل میں داخل شفا یات کیا گیا پھر ہالپر نے اور ڈاکٹر نے ۱۵،۵ ایف ہزائل میں فرانس میں فینو تھیزین پیش کیا۔

اس کے بعد چند ہی سالوں میں بہت سی جدید ترین انٹی ہسٹامین ادویات پیش کی گئیں جن کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

چند خاص الخاص انٹی ہسٹامین ادویات

(۱) ۹۲۹ ایف

(۲) ۱۵،۵ ایف

یہ دونوں عوامل بازار میں دستیاب نہیں ہوتے صرف کتاب ہی کی زینت بنے رہتے ہیں۔

Antergan

(۳) انٹرگان

یہ مادہ بھی ناقابل حصول ہے۔ لیکن اس کا جدید مشتق آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے

Neo-Antergan

(۴) نیوانٹرگان

یہ مادہ فرانس میں اسی نام سے مشہور ہے لیکن انگلستان میں سپارٹرا میں بیٹ کہلاتا ہے اور

اس کا تجارتی نام انٹی سانی ہے یہ برٹش نارکوہیا اور نیوانٹرگان آفیشل میڈیٹیز میں درج ہے یہ ایک بے رنگ قاشدار جامد پانی میں قابل حل مادہ ہے۔ یہ انٹی ہسٹامین تاثیر کے علاوہ مقامی مسکن اثر بھی رکھتا ہے اگرچہ تمام انٹی ہسٹامین ادویات ایسے مل کو لین کے مخالف اثر رکھتی ہیں لیکن یہ کچھ دیر ایسا ہی اثر رکھتا ہے۔ اگرچہ اس کی تاثیر کی کوئی معالجاتی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس سے اس کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔

یہ جسم میں یہ آسانی سے پھیل جاتا ہے اور جسم سے فوراً خوبی کے ساتھ غیر تبدیل شدہ حالت میں خارج ہو جاتا ہے اور اس کو متواتر ۲ یا ۴ گھنٹے کے وقفے سے دیا جاسکتا ہے یہ ایک سرخ الاثر دوا ہے اور اس کی ایک منیاد کا اثر ۵ سے ۸ گھنٹے تک رہتا ہے لہذا اس کو روزانہ کم از کم تین بار دیا جاسکتا ہے۔ معتادگی :- یہ دوا براہ دہن دی جاتی ہے اور شکر کے غلاف والی گولیاں ہی زیادہ بہتر خیال کی جاتی ہیں، عام طور پر روزانہ کی مقدار ۰.۱ تا ۰.۲ گرام ہوتی ہے اور ۰.۵ گرام تک دی جاسکتی ہے۔ ہمیشہ روزانہ کی مقدار ۲ تا ۴ گھنٹے کے وقفے سے دینی چاہیے اور جب اس کا رد عمل ظاہر ہو جائے تو اس کو روک دینا چاہیے خراش معدہ کی صورت میں اس کو بعد از طعام دینا چاہیے بچے اس کو خوب بڑا کر لیتے ہیں لہذا بارہ سال کی عمر کے بچے کو یہ اسی مقدار میں دی جاسکتی ہے۔

واہیات اور اشارات علاج :-

(۱) حالت حساسیت

(۲) جذباتی متبلی

(۳) تپ کا ہی

(۴) عروقی حرکت سے التهاب انف

(۵) شری اور عروقی تھپی اذیمیا

(۶) ادویات کا رد عمل مثلاً پینی سیلین، اسٹریپٹومی سیلین، ڈایا لیزین، بارٹون مرکبات، سلفا

ادویات، مصنوعی دافع طبریا ادویات، مرکبات ذہب، سنگھیا کے مرکبات اور سرمہ دافعی (کھڑ

د)، استہدائی رد عمل جو بیرونی پردہ پھیلنے کے سبب ہوں مثلاً :-

لیور انجکشن، انسولین انجکشن، سیرم انجکشن، اور بلازما کے استعمال ڈنگ مارنا مختلف اسباب



کی خراش جلد۔

یہ دوا شری دیتی اچھلتا، اور عرونی جسمی اذیمیں تو مخصوص ہے اور ناکامی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے اور مگر نہ ناکافی دوا استعمال کرنے اور دوا غلط استعمال کرنے سے یہ کمزور ثابت ہو۔ اس دوا کی سب سے نمایاں شاندار شفا بخشی یہ ہے کہ یہ جلد کی خراش کو قطعی ختم کر دیتی ہے اور پہلی مقدار دینے کے تین گھنٹے بعد اپنا شافی اثر پورا کر دیتی ہے اس کے ساتھ ہی اضرار میں کمی ہونے لگتی ہے۔ البتہ اس دوا کے استعمال سے خراش جلد تو ضرور ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا سرچشمہ ختم نہیں ہوتا بلکہ مزید خراش سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔

عرونی جسمی اذیمیں جب کہ زبان کا درم یا حساسیتی حادثہ رونما ہو تو یہ دوا موثر نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے اور بیالین کا انجکشن ہی شفا کا پیغام ثابت ہوتا ہے۔ (دیکھئے جسمی حمل اشتراک) ادویات کے رد عمل شلایپی سلین، اسٹریٹو مائی سین اور انسولین وغیرہ اور ڈنک مارنا۔ ایکٹس کوڑوں کا کاشا، بھجھو کا کاشا میں اس دوا کے استعمال سے فوراً شفا پائی نمودار ہوتی ہے۔ سیرم کی بیماری میں جلد کی خراش اور جیٹھلنا کو تو سکون مل جاتا ہے لیکن درد اعصاب اور بخار کو آرام نہیں ملتا اس کے لئے ایپی سی پور بھی استعمال کرنا چاہیئے۔

تب کا ہی صروف ۵ فیصدی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور ۲۰ فیصدی مریضوں میں ان کا علاج کرنے پر مدار ہوتا ہے تب کا ہی کی بہ نسبت ریش انف اور سوزش ناک میں زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر اس کو نزلے و زکام میں امید افزا بتلاتے ہیں لیکن تجربہ کار ڈاکٹر اس کو صرف حساسیتی زکام میں اچھا خیال کرتے ہیں اور اس مقصد کے لئے ایک مرکب کو ری سیڈین شیرنگ کو پوریشن فی تیار کیا ہے۔

یہ قات کی خراش میں اس دوا سے بعض اوقات پریشان کن کھجلی دور ہو جاتی ہے۔

خراش فرج و مفرد میں بھی یہ دوا بعض اوقات مفید ہوتی ہے اور جلد کی بیماریوں میں (حک) کماحقہ کے لئے ایک محجرب دوا ہے اس مقصد کے لئے اس کو گرم گرم اور لوشن کی شکل میں مقامی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ جذبات خود مرض کے ضرر پر کوئی اثر نہیں کرتی البتہ مریض کھجلی اور کھرچنے سے بچ جاتا ہے اور آرام ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے لیکن ان ادویات کے استعمال کے

بعض اوقات تماس التهاب جلد قسم کا حساسیتی منظر رونما ہو جاتا ہے۔

درم میں غالباً یہ دوا مفید ہو سکتی ہے لیکن اس حالت عرض میں اس کا محالجاتی تجربہ ناکام رہا ہے اور بہت کم مریضوں کو اس سے آرام ہوتا دیکھا گیا ہے۔

ناخنوں کو ررد عمل اور ممنوعا ست: اگرچہ یہ دوا عام طور پر نہایت قابل برداشت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات مندرجہ ذیل رد عمل ظہور میں آسکتے ہیں

(۱) احصنا ہضم کی بے چینی

اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو خوب چینی دی جائے اور اس کا شربت پلایا جائے۔ اور دوا کو بعد از طعام دیا جائے۔

(ب) گہری نیند

اگرچہ یہ کم ظہور میں آتی ہے لیکن اس کو روکنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایفیدرین ہائیڈروکلورائیڈ گریں کی کھجلی خلاتی جلیئے یا امفیٹامین سلفیٹ ۵ ملی گرام علی الصبح دے دی جائے

(ج) منہ کی خشکی، دوار سر، معمولی درد سر

یہ اس دوا کی دوسری عام بری علامت ہے جو منہ کی اور دستوں کے ساتھ نمودار ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوا کو بعد از طعام دیا جائے خالی معدے میں ہرگز نہ دیا جائے

(د) چڑچڑاہٹ اور تھلا

یہ احساس کبھی کبھار ہی نمودار ہوتا ہے۔ لہذا ایسے مریضوں میں اسے استعمال نہ کیا جائے

یہاں پر ایسے میسلی برٹ کے حرکات

(۱) انٹی سٹان Anthisan

یہ ۵۰ ملی گرام اور ۱۰۰ ملی گرام شکر کے غلاف دار گولیوں کی شکل میں دستیاب ہوتی ہے

(۲) انٹی سٹان الیکٹر Anthisan Elixir

یہ ایک فلوئڈ ڈرام میں ۲۵ ملی گرام دوا شامل ہوتی ہے اور یہ بڑے بچوں میں خاص

طور پر تجویز کی جاتی ہے اور جو افراد دوا کی کھجلی نہ لگتے تھے ان کو بھی دی جاسکتی ہے

(۳) انٹی سٹان سولوشن فار انجکشن

## (۳) انتھی سان سولوشن فار انجکشن

یہ ۲۵ فیصدی کا محلول ہے جو شدید مرض میں انجکٹ کرنا چاہیئے۔ اس کا گہرا درد و  
ھضلاتی انجکشن لگانا چاہیئے زیر جلد راہ سے نہیں دینا چاہیئے کیونکہ اس محلول سے مقامی خون  
دباؤ پیدا ہو جائے گا کبھی کبھی درد و دیریدی راہ سے بھی انجکٹ کیا جاسکتا ہے اور انجکشن بہت  
سے لگانا چاہیئے پہلے کم مقدار میں ۲ سی سی کا محلول انجکٹ کرنا چاہیئے۔ ممکن ہے اس سے شدید  
رد عمل بھی پیدا ہو جائے۔

## Anthisan Cream

## (۴) انتھی سان کریم

یہ ۲ فیصدی کی کریم ہے جو مقامی طور پر جلد پر لگائی جاتی ہے ایک اداس کے یوب میں  
دستیاب ہوتی ہے۔ یہ مقامی بخیر اور مسکن اثرات کی حامل دوا ہے اور مندرجہ ذیل مقاصد  
کے لئے عام استعمال کی جاتی ہے۔

(۱) حساسیتی اقسام کی جلدی تکالیف دور کرنے کے لئے براہ دہن انتھی سان کے ہمراہ یہ  
مقامی طور پر لگائی جاتی ہے۔

(۲) یہ شدید خارش کے تمام حالات میں ایک زبردست دافع خارش دوا ہے

(۳) معمولی قسم کے حرق نار میں مفید ہے اور یہ اس حالت درد کو فوراً دور کرتی ہے اور  
آبلہ چڑنے سے بچاتی ہے۔

یہ عارضی استعمال کے لئے ایک مفید دوا ہے اور مرضی حالات میں زیادہ دنوں تک  
استعمال نہیں کی جاتی۔ اس کو کسی پھیلاؤ پر لگا کر مقام مادون پر لگایا جاسکتا ہے اس کو دو تین بار  
لگانے سے فوری سکون حاصل ہو جاتا ہے زیادہ دن تک لگانے سے گہری نیند اور ذہنی آشوب  
پیدا ہو جاتی ہے۔

## Anthical

## (۵) انتھی کال

یہ میپا کرائین میٹیٹ اور کیلا مین لوشن کا مرکب ہے جو پیش نش (سورج سے  
آگ سی لگ جانا، بھجھو یا بھٹکا کا ڈنگ مارنا، اور دیگر خارش جلدی حالتوں میں ایک زبردست  
دافع خارش دوا ہے۔

یہ ۴ قلوٹو اونس کے مشول میں دستیاب ہوتی ہے۔

## (۶) کوری سیدین

## Coricidine

مستحضر:- شیرنگ کارپوریشن بلوم فیلڈ لوئیس اے  
یہ میپا کرائین میٹیٹ اور اسے پی سی پور کا مرکب ہے جو بھجھو کی خٹک میں عام دستیاب  
ہوتا ہے۔

یہ حساسیتی نزل و زکام کے لئے ایک مخصوص علاج ہے اور اسے سیرم کے انجکشن کے بعد درد  
و بخار کو بھی دور کر لے اور درد شقیقہ کے لئے بھی مفید ہے۔

ایک یا دو ٹیکہ روزانہ استعمال کرنے سے مرض میں فوری بحالی پیدا ہو جاتی ہے۔

## پرو میتھازین ہائیڈروکلورائیڈ

-۵-

## Promethazine Hydrochloride

## Phenergan

## فرنگان

یہ میپا کرائین میٹیٹ سے تقریباً ۱۰ گنا قوی تاثیر مرکب ہے اور اس کی متعاد بھی تقریباً ۱۰  
ہے اثر کی مدت بھی انتھی سان کے برابر ہے لیکن یہ طویل الاثر مرکب کہلاتا ہے یہ ناخوشگوار اثرات  
بھی کم پیدا کرتا ہے اور ۱۲ سے ۱۴ گھنٹے تک اس کا اثر برقرار رہتا ہے اور یہ دوا ۲ تا ۱۰ ملی گرام  
کی مقدار میں بہترین نتائج کے ساتھ استعمال کی جاسکتی ہے۔

اشارات علاج:- یہ دو مندرجہ ذیل حالات میں شاندار نتائج پیش کرتی ہے

(۱) شری (چی اچھلنا)

سیرم کی بیماری سے چی اچھلنا میں بہت مفید ہے۔ ۵۰ ملی گرام کی ایک ٹیکہ ہی براہ دہن سے  
حفاظت دی جاسکتی ہے اگر یہ ناکافی ہو تو دو ٹیکے دی جاسکتی ہیں اس سے درد بھی دفع ہو جاتا

(۲) حساسیتی التهاب الغا

یہ دوا ناک کی ریش، چینک اور حساسیتی زکام اور ناک کے ٹھساؤ کو دفع کرتی ہے

(۳) عرونی صہبی اذیا:- اس حالت میں فرنگان فوری بحالی پیدا کرتی ہے۔



(۴) ششجی دمہ

اس مرض میں اس کی کامیابی بہت کم ہے لیکن یہ نسخہ کو دور کرتی اور دئے کے جلے سے بچاتی ہے اور بطور دافع نسخہ اثر کرتی ہے۔ اور حساسیتی دمہ میں قابل قدر دوا ہے

(۵) حاملہ کی تے اور متلی

اس حالت میں فزکان کسی قدر مفید ہے اور سمندری مٹی میں بھی ہائیوسین سے بہتر سمجھی جاتی ہے اور اس مقصد کے لئے اس کا جدید مرکب ادویہ میں شکل بھی استعمال کیا جاتا ہے

یہ نسخہ کی متلی، کارکی متلی اور موٹر کی متلی میں مفید موثر بتائی جاتی ہے

(۶) اسٹریپٹومائی سین کے سبب تے

اس حالت میں فزکان مسکن تے دوا ثابت ہوتی ہے۔

پرومیٹھازین ہائیڈروکلورائیڈ کے مرکبات

(۱) فزکان ٹبلٹس

یہ ۱۲ اور ۲۵ ملی گرام کی شکل میں دستیاب ہوتی ہے اور ۵۰ پیچوں کا مشمولہ دستیاب ہوتا ہے۔

(۲) فزکان الیکٹر Phenergan Elixir

یہ چار فلونڈ اونس کے مشمولہ میں دستیاب ہوتی ہے اور ایک ڈرام میں ۵ ملی گرام دوا ہوتی ہے۔ یہ بچوں بڑھوں اور بچہ نہ لگنے والے افراد کو بہ آسانی دی جا سکتی ہے

(۳) فزکان سولوشن Phenergan Solution

یہ ۲۵ فیصدی کا محلول ہے جو ۲ سی سی امپول کی شکل میں ۱۰ امپول کے بکس میں دستیاب ہوتا ہے یہ درون دریدی راہ سے انجکٹ کیا جاتا ہے اور شدید دمہ میں بہت آہستہ سے انجکشن لگایا جاتا ہے حتیٰ کہ سکون ہو جائے۔

(۴) فزکان کریم Phenergan Cream

یہ پرومیٹھازین اور ڈیڈ موپرو پامیڈین کا مرکب ہے ایک اونس کے ٹیوب میں دستیاب

ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پر معمولی درجہ نار (جلنا) کے ابتدائی علاج میں مفید ہے۔ اور یہ التهاب و درم کو کنٹرول میں کر لیتی ہے، درد کو بھی کم کرتی ہے۔ یہ جلد کو چھین نہیں کرتی اور باسانی کھال پر لگائی جا سکتی ہے۔

(۵) فنس ڈاکس Phenesdyl

اس کا نسخہ یہ ہے۔

فزکان ۳/۴ ملی گرام  
کوڈین فاسفیٹ ۹ ملی گرام  
ایفیڈرین ہائیڈروکلورائیڈ ۲ ملی گرام  
یہ ایک فلونڈ ڈرام کا وزن ہے۔

یہ چار فلونڈ اونس کے لٹوک کی شکل میں دستیاب ہوتی ہے اس کا دوسرا نام پرومیٹھازین کی ٹبلٹس (لٹوک رسال) بھی ہے

اس نسخے سے ملتا جلتا ایک دوسرا مرکب امریکہ میں جان دانتھ نے بھی تیار کیا ہے جس کا نام فزکان وڈ کوڈین سیرپ ہے۔

یہ دونوں مرکب طویل الاثر انٹی ہسٹائین ہیں اور تشہیر یہ پرمسکن اثر رکھتے ہیں۔ موثر اور منفعت یلغ ہیں اور گھبراہٹ کے لئے بہت مفید ہیں

ایک تیسرا مرکب آرگے ن یو این اے نے بھی ٹوسان نام سے تیار کیا ہے جاپانٹ کی بوتل میں دستیاب ہوتا ہے۔ اور کھانسی کو روکنے کے لئے ایک جدید دوا ہے

برکش فارما کو پیما کے مرکبات!

(۱) میپائرا مین ٹیٹ

معتاد:- ۳ تا ۸ گرام روزانہ

(۲) ٹبلٹس آف میپائرا مین ٹیٹ

معتاد:- ۳ تا ۸ گرام روزانہ

(۳) ٹبلٹس آف پرومیٹھازین ہائیڈروکلورائیڈ

مقدار:- ۲۵ تا ۵۰ ملی گرام روزانہ

نوٹ:- این این آر میپائرا مین ٹی ٹیٹ کا دوسرا نام بائری لائین میلی ٹٹ دنت ہے۔

۶۔ ٹرائی پیلے ٹامین ہائیڈروکلورائیڈ

Tripeleannamine Hyd

Pyribenzamiae

P. B. Z.

پائری بنزرائین  
پی بی زیڈیہ بھی ایک اسی ہشامین دوا ہے جو پوائس اے فارما کو پائس درج ہے اور اس کی  
مقدار ۵۰ ملی گرام روزانہ ہے۔یہ ایک سفید کاشدار سفوف ہے جو روشنی لگے سے کسی قدر سیاہ ہو جاتا ہے یہ باڈار  
میں میچ کی شکل میں دستیاب ہوتی ہے۔یہ میپائرا مین سے زیادہ نہر لی ہے اور اس سے عام طور پر نمایاں مسکن دماغ اثر نمود  
ہوتا ہے جو موثر وغیرہ چلائے دالوں کے لئے مضر ہے۔اس دوا سے نفاس (دنگھ) سی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات غشی سی بھی نمودار  
ہو جاتی ہے۔نظام عصبی کے دیگر اثرات مثلاً دوار سر، سر بچکانا، ذہن کا باطل ہونا، ایے جی پی، چڑچڑاہٹ  
اور حرکت کی سی حرکات واقع ہو جاتی ہیں۔اعضا پر ہضم پر بھی اس کے اثرات مثلاً منگی، قے، ٹھوڑ، دست وغیرہ بھی واقع ہو سکتی ہیں  
اور ان ادویات سے دافع تشخ اثر بھی برآمد ہو سکتا ہے۔آج کل اس دوا کا استعمال بہت ہی کم ہو گیا ہے کیونکہ یہ دوا اگر انیولوسائٹوسس جیا  
یا التهاب جلد پیدا کر دیتی ہے۔یہ دوا دل پر کوئی ٹپن جیسا اثر کرتی ہے اور نہ ہر لی مقدار میں دیتے سے نظام عصبی میں  
بیش ہجوان ولرزہ اور دورے پیدا کر دیتی ہے بہر کیف یہ دوا عام استعمال کے لئے بہت ہی ہر لی ہے۔اشارات علاج:- پائرا بنزرائین بلورمر ہم ایک مقامی مخدر دوا ہے اور میٹائی سکین  
کی طرح کام کرتی ہے اور اس کا مقامی استعمال (۲ فیصدی کا محلول) جبری بول کی تخذیر میں  
استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اور پورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہترین مخدر ہے جس کی تروالی  
دوا ہے۔

براہ دہن استعمال کے لئے اس کی ٹپیاں استعمال کجائی ہیں جو حساسیت عوارض میں مفید؟

۷۔ ڈائی فن ہائیڈرائین ہائیڈروکلورائیڈ پوائس پی

Diphenhydramine Hyd

Benadryl

بینا ڈرل (پارک ڈیوس)

یہ دوا ایک زبردست اسی ہشامین ہے اور تین صفات رکھتی ہے

(۱) یہ ہشامین یا استہدائی صدمہ سے پیدا شدہ شجی تشخ کو دفع کرتی ہے۔

(ب) نرم عضلات کے تشخ کو سکون دیتی ہے۔

(ج) ہشامین کے عودتی قایلغ اثرات کے مفاد کام کرتی ہے۔

یہ مختلف حساسیت عوارض دما راض میں عام استعمال کجائی ہے مثلاً

(۱) یہ اندوں، دودھ، اور دیگر حساسیتیں اثر کرتے والی غذاؤں سے پیدا شدہ الرجی

(حساسیت) میں عدم حساسیت حاصل کرنا دشوار ہو فوری جواب پیش کرتی ہے یعنی مینی سلین

اور دیگر ایسی ہی ادویات کے رد عمل میں بحرانی حالات میں یہ دوا بہت موثر ادویات ہو سکتی ہے

(۲) یہ شدید شری (جی اچیلنا) میں تقریباً ۹۴ فیصدی افراد میں علامات کو فوراً سکون

دیتی ہے اور خراش جلد دکھاج (دکھلا ہٹ کو آدھے گھنٹے میں ہی دفع کر دیتی ہے اور مینی سلین

سے پتی اچیلنا میں ایک زبردست دافع حساسیت دوا ثابت ہوتی ہے۔

(۳) یہ التهاب الف عودتی دناک سے خوب ریش بہتا، میں نہایت اطمینان بخش دوا ہے

اور ۵ تا ۱۰ ملی گرام کی مقدار میں سوئے وقت صرف ایک مقدار استعمال کرنے سے مرعین تمام

رات آرام سے سو سکتا ہے



(۴) یہ موسمی تپ کا ہی دھماکے بھوس کے اثر سے پیدا شدہ بخار، میں ۹۵ فیصدی سودمند ثابت ہوتی ہے اور بلا خوف و خطر بخیرانی کجا سکتی ہے۔

(۵) مزید برآں یہ دوا عروقی عصبی اذیت، درد شقیقہ اور دمہ میں بھی مفید خیال کجائی ہے۔ شدید شری میں بہت زیادہ مفید ہے لیکن دے میں قطعی کامیاب ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ دمہ کے شدید حملوں کو بڑھاتی ہے البتہ اس کو بطور حفظ یا تقدم استعمال کیا جاسکتا ہے۔

طریقہ استعمال اور مقدار:۔۔۔ بنیاد ڈل براہ دہن کیپ شول کی شکل میں عام بخیر کجائی ہے لیکن درون عضلاتی اور درون دریدی راہ سے بھی ۶۰ ملی گرام بنیاد ڈل اور اسی سی ڈائل سیلائن میں حل کر کے، ۱۰ منٹ کے وقفہ سے انجکٹ کجائی ہے۔

بالغ فرد کے لئے مقدار ۵ تا ۱۰ ملی گرام روزانہ ہے اگر ضرورت پڑے تو یہ مقدار بڑھائی بھی جاسکتی ہے یہ دوا بعد از طعام دن میں چار بار دی جاتی ہے آخری مقدار سونے سے قبل بجائی جو بچوں کے لئے ۵۰ ملی گرام فی پونڈ جسمانی وزن پر دی جاتی ہے

زہریلے اثرات ۱۔ اس کے دوا ہم مخالف اثرات ہیں نفاس (چنگ اور... ادنگ) اور کسل مندی ان پر غالب آنے کے لئے مرلین کو سیاہ قہوہ، کیفین، بنزڈرین یا ایفڈرین دیجئے۔ دوا سر اور نصارت کا خلل، زیرہ مسد ہے جینی اور بعض اوقات متلی وقفے، سلسل پول بھی مشاہدے میں آجاتے ہیں۔

یہ دوا منوم دوا اولیہ پرین سے حساسیت بخیرنے دلا کو احتیاط سے دینی چاہیئے۔

ڈائی فن ہائیڈروکسین کے تجارتی مرکبات

(۱) بنیاد ڈل کیپ شول

یہ ۵۰ ملی گرام کا ایک کیپ شول اور ۵ کیپ شول کی بوتل میں دستیاب ہوتی ہے۔

(۲) بنیاد ڈل سیرپ Benadryl Syrup

ایک چائے کا چمچ بھر میں ۱۰ ملی گرام دوا شامل ہوتی ہے اور چاراونس کی بوتل دستیاب ہوتی ہے یہ دوا صرف امریک کے فارماکوپیا میں درج ہے۔

Antazoline Hyd

Antistine

۸۔ انٹازولین ہائیڈروکلورائیڈ  
انٹین

یہ حساسیتی نکالنے کے علاج کے لئے ایک مصنوعی انٹی ہسٹامین ہے جو حساسیتی علامات کے ظہور میں ہسٹامین کے اثرات کو زائل کرتی ہے یہ قابل برداشت اور بافتوں پر خراش اور اثر نہیں کرتی یہ براہ دہن، درون عضلاتی راہ سے اور درون دریدی راہ سے استعمال کجا سکتی ہے مقدار ۱ اور طریقہ استعمال:۔۔۔ براہ دہن بہ شکل چمکے دن میں تین بار بھر فی بار کھانے کے دوران میں استعمال کجائی ہے ایک دن میں ضرورت پڑے پر چھ چمکے تاکہ کجا سکتی ہے ٹیکہ کو زبان پر رکھ کر ٹھوڑے سے پانی سے نگل لینا چاہیئے نوش کرنے سے پہلے پانی میں حل کر دی جاسکتی ہے

درون عضلاتی یا درون دریدی انجکشن:۔۔۔ دن میں ایک یا دو سی سی کا امپول ۳ بار درون عضلاتی راہ سے لگا جاسکتا ہے درون دریدی انجکشن نہایت آہستہ سے لگانا چاہیئے ایک امپول کی دوا ۲۰ منٹ میں داخل دریدی کرنی چاہیئے

بہت سے حالات میں چند دن علاج کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ضرورت پڑے تو پھر ان ٹین کچھ زیادہ عرصے تک بخیرانی کجا سکتی ہے۔

اشارات علاج:۔۔۔ یہ دوا مندرجہ ذیل عوارض و امراض میں عارضی ناکام کرتی ہے

(۱) شری (پتی اچھلنا۔ چھپاکی)

(۲) سیرم کا ٹوران جلد۔ یکا یک و کچین یا سیرم کا انجکشن لگاتے ہی پھنیاں نمودار ہوتا

اور دوڑے پڑ جانا

(۳) خراش جلد دکھاج (۴) تپ کا ہی (۵) شعی دمہ

انٹازولین کے مرکبات

Antistine Tablets

(۱) انٹین ٹبلٹس

دستخط:۔۔۔ سیالٹیڈ

یہ اگر گرام کی بجائے ۲۰ ملٹیوں کی شیشی میں دستیاب ہوتی ہے

(۲) ان ٹسٹین امپول Antistine Ampoule

یہ اگر گرام ۲۰ سی سی کے امپول اور ۵ امپول کے کچن میں دستیاب ہوتی ہے۔

(۳) ان ٹسٹین پریوین Antistine Privine

یہ ان ٹسٹین اور نافا زونین کا مرکب ہے جو ناک کے لئے بطور محرک طبع برائے نزلہ و زکام دستیاب ہوتا ہے۔ یہ سوپوشن ایک آکر کے ذریعے ناک میں لگایا جاتا ہے

(۴) ان ٹسٹین کریم Antistine Cream

یہ کریم جلدی امراض میں بطور دافع خراش و خمدار استعمال کیجاتی ہے اور شدید قسم کی خراش جلد میں بہت مفید ہے۔

یہ کریم کسی نرم کپڑے پر لگا کر جلد پر چکائی جاسکتی ہے یا جلد پر آہستہ سے ملی جاسکتی ہے اگر اس سے آرام نہ ہو تو براہ دہن مٹیلا و درودن حضراتی راہ سے امپول استعمال کیا جاسکتا ہے یہ کریم ۲ فیصدی طاقت کے ۲۰ گرام کے ٹیوب میں دستیاب ہوتی ہے

Dibistine

۹۔ ڈی بیسٹین

یہ ان ٹسٹین اور پائٹری تیزابین کا مرکب ہے جو ایک زبردست قوی تاثیر انٹی ہسٹائین دوا کا فعل ہے۔ یہ مرکب بہت ہی سریع الاثر اور قابل برداشت ہے اور بہت سے مریضوں میں اطمینان بخش بھائی پیدا ہوجاتی ہے اور یہ مرکب ایک اثر آفریں انٹی ہسٹائین آمیزہ ہے اس لئے کم مقدار میں دینے سے بھی بہت شاندار نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ سیبا کے ڈاکٹروں کا بیان ہے کہ یہ ۹۰ فیصدی مریضوں میں فوری شفا بخش انٹی ہسٹائین دوا ہے اور یہ مرکب تمام ایلی دواؤں سے موثر ہے۔

مختادگی اور طریقہ استعمال :- یہ دوا ٹیکہ کی شکل میں روزانہ ایک یا دو مچھیرے میں بار استعمال کیجاتی ہے شدید حالات مرض میں علامات کو فرو کرنے کے لئے ۴ مچھیرے فوراً دینی چاہئیں۔ لیکن علاج کا مقصد مقدار کم کرنا ہونا چاہیئے یہ غلاف دار مچھیرے سالم کی سالم لنگھ لینی چاہئیں۔ اور بعد از طعام دینی چاہئیں اگر زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے معدے کی بے چینی اور

متلی وغیرہ پیدا ہوجائے تو اس کی مقدار فوراً کم کر دینی چاہیئے

واحیات و اشارات علاج :- یہ دوا مندرجہ ذیل حالات میں کامیاب نتائج کے ساتھ استعمال کی گئی ہے۔

(۱) حساسیت کے متعدد اقسام مثلاً موسمی اور غیر موسمی التهاب، شدید اور مزمن شری غیر مقامی التهاب جلد وغیرہ۔

(۲) حساسیتی التهاب الف، اس مرض میں یہ ۹۰ فیصدی کامیاب ہے مقامی طور پر ناک میں ان ٹسٹین پریوین سوپوشن بھی لگانا چاہیئے۔

(۳) شری عودتی جسمی اذیتا۔ یہ دوا اس مرض میں خراش کم کرتی ہے ورم اتار دیتی اور سکون دیتی ہے مقامی طور پر ان ٹسٹین کریم بھی لگانی چاہیئے۔

(۴) خراش جلد وغیرہ۔ یہ دوا خراش اجزاء (سرخ جلد) اور ورم کو دور کرتی ہے اور جلد کو مکھڑچے سے بچاتی ہے اور خراش فروج و معقد میں بھی ان ٹسٹین کریم حرج ثابت ہوتی ہے۔

(۵) دوا مفصل اور اسٹی بولک ادویات کی حساسیت :- یہ دوا ان حالات میں بطور حفظہ اقدام و علاج مفید ہے اور بہترین نتائج پیش کرتی ہے۔ بچپن، تنہا اور بھڑکے کالے کا ورم فوراً دور کرتی اور جلن کو رفع کرتی ہے۔

(۶) دیگر حساسیتی علاج مثلاً سفی متسی، التهاب گردہ ستیلا اور شناعی بیماری میں بھی بہت

فراہمی :- یہ دوا عام طور پر ٹیکہ کی شکل میں دستیاب ہوتی ہے ۲۰ اور ۱۰۰ ملٹیوں کی شیشی میں دستیاب ہے۔ یہ ایک جدید مرکب ہے۔

Histantin

۱۰۔ ہسٹانٹین

یہ کلورسائیڈ زین ہائیڈرو کلورائیڈ ہے جو امریکہ میں ہیرازل کے نام سے مشہور ہے یہ ایک نئی قسم کی دافع حساسیت دوا ہے جو دیکم لیسرچ لیسور ٹریڈ کا ہونیو بارک میں ایجاد کی گئی ہے تجربات و مشاہدات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ دوا اپنے دیگر حامل مرکبات کی نسبت زیادہ موثر، دیر پا اور شگم سے مبرا ہے۔



یہ دوا براہ دہن ۵۰ ملی گرام مکھیک کی شکل میں دستیاب ہوتی ہے۔

فعل :- یہ دوا دینے وقت ہی ۲۴ گھنٹے میں اپنا موثر اثر پیش کرتی ہے اور معمولی اور پرانی حساسیتوں میں کم سے کم مقدار میں دینے سے فوری بحالی پیش کرتی ہے اور شفا بخش مقدار میں دینے سے کوئی زہر بلا رد عمل پیدا نہیں کرتی اور بعض اوقات زیادہ مقدار میں دینے سے لغاس (اڈجکٹ) کا سار دھن پیدا کر دیتی ہے۔

داعیات و امتکارات علاج :- یہ دوا تمام عام حساسیتی ظواہر کو سکون دینے کے لئے بہ آسانی استعمال کیجا سکتی ہے اور یہ مندرجہ ذیل ظواہر حساسیت میں ایک فوری اور علاقی سکون بخش دوا ہے۔

(۱) تپ کا ہی (۲) عروقی حرکی التهاب الف

(۳) جراثیم گردوغبار سے حساسیت (۴) شبعی دم

(۵) ہائپر پلاسٹک التهاب جوف الف (۶) حساسیتی بنیاد پر مبنی اعضا تھن کے فعل (۷) حساسیتی امراض جلد مثلاً شرئی، اتماس التهاب جلد پودوں کے چھونے سے سوز جلد ادویات سے صنعتی اشیا و کیمیائی اشیا سے التهاب جلد وغیرہ۔

(۸) حساسیتی اکڑیا اور خراش جلد

(۹) اعضا رھیم (معدہ و امعاء) یا غذا سے حساسیت

(۱۰) عروقی جھبی اذیما۔

یہ دوا ایسے شدید جلدی اور استہدانی رد عمل کو کٹرول کرنے کے لئے بھی قابل قدر ہے۔ جو انٹی بوٹک ادویات، انٹی ٹوکسک سیرم اور مخصوص ادویات یعنی سلفا ادویات وغیرہ کے استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتے ہوں۔

یہ دوا فیر طبی جلدی حساسیت کے مریضوں میں بھی آزمائی جا سکتی ہے مثلاً تپش شمش (سونج کی روشنی زیادہ لگنے سے پتی وغیرہ اچھلنا) سردی زیادہ لگنے کے سبب ہسٹا مین ایجو رد عمل اور جلدی لکیروں میں بھی استعمال کیجا سکتی ہے۔

یہ دوا مریض حساسیتی خلوں میں اصولاً علاقی سکون پیش کرتی ہے لہذا ان حالات میں

اس کا استعمال صرف عارضی کنٹرول کرنے کے لئے ہوتا ہے مزید برآں مخصوص الرجن، غذائی کمزیر خوشگوار ماحول بھی بروئے کار لانا چاہیئے۔

معتادگی اور طریقہ استعمال :- یہ دوا معمولی حالات مرض میں ۵ تا ۱۰ ملی گرام (۱ تا ۲ ٹیکہ) روزانہ دی جا سکتی ہے۔

شدید حالات مرض میں ۳۰ ملی گرام ہر روز دی جا سکتی ہے مگر یہ مقدار دن میں بکھرے کر کے دینی چاہیئے حتیٰ کہ سکون پیدا ہو جائے اور مریض کو آفاقہ ہوتے ہی یہ مقدار فوراً کم کر دی جائے یا دوا روک دی جائے۔ اگر کوئی رد عمل پیدا ہو تو گرم چائے یا قہوہ وغیرہ پلانا چاہیئے۔ یہ دوا اپانی کے ہمراہ بعد از طعام نگل لینی چاہیئے۔

مخالف اثرات :- معمولی شافی مقدار میں دینے سے یہ دوا نسبتاً بہت کم مخالف اثرات کا وقوع پیش کرتی ہے۔ مزید برآں متواتر زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے کوئی خاص زہر بلا رد عمل نمودار نہیں ہوتا البتہ کئی قدر لغاس زا دیکھائی پیدا ہو جاتی ہے جو دیگر انٹی ہسٹا مین ادویات سے ہمیشہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دوا کے استعمال سے یہ رد عمل بہت کم وقوع میں آتا ہے یہ دوا ۵۰ ملی گرام فی ٹیکہ (۵ ٹیکوں کی شیشی) میں عام دستیاب ہوتی ہے اور اس کو بروز ویکم اینڈ کمپنی لمیٹڈ لڈیا نے پیش کیا ہے۔

#### Ancholan

#### ۱۱- انکولان

یہ میٹکلوڈین ہائیڈروکلورائیڈ ہے جو ایک جدید انٹی ہسٹا مین مادہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مادہ بہت کم زہر بلا اور طویل الاثر ہے اور دیگر ایسے ہی مخالف اثرات سے مراد ہے داعیات اور اشارت علاج :- یہ دوا زیادہ تر مندرجہ ذیل امراض کے علاج میں تجویز کیجاتی ہے۔

(۱) جراثیمی تپ

(۲) حساسیتی حالات یعنی جلد، تھن یا اعضا رھیم کے مریض سے پیدا شدہ

یہ دوا مندرجہ ذیل حالات میں فوری سکون دیتی ہے

- (۱) شری (پتی اچھلنا) (۲) عروقی جسمی انڈیا  
(۳) ڈنک مارنا کاٹنا وغیرہ (۴) صنعتی اشیاء سے متاس التهاب جلد  
(۵) انٹی یونٹک ادویات سے پیش حساسیت  
(۶) سیرم، انسولین، لیوڈاکسٹک وغیرہ سے پتی اچھلنا وغیرہ اور حساسیت کی زیادتی  
یہ دو اندر درج ذیل حالات امراض میں بھی بخوبی کی جاسکتی ہے  
(۱) دمہ (۲) تپ کا ہی  
(۳) حساسیتی التهاب نم (سوزش دہن) جو اکثر انٹی یونٹک ادویات کے استعمال کرتے  
سے پیدا ہو جاتا ہے۔  
(۴) منگی اور تے جو اکثر حمل کے دوران میں اور تسبیحی بیماری (ریڈیشن بیماری) کے سامنے  
نمودار ہوتی ہے۔  
معتادگی اور طریقہ استعمال :- مندرجہ ذیل حالات میں معتادگی کا جدول حسب ذیل  
ہوتا ہے اور یہ دوا شدید حالات میں روزانہ ۴ یا ۵ گھنٹے تک دی جاتی ہے۔  
(۱) حساسیتی حالات میں  
متوسط حالات مرض میں آیا دو گھنٹے بعد از طعام (شام کے کھانے کے بعد) ایک ہفتے  
تک دی جاتی ہے پھر ضرورت پڑنے پر اسی روزانہ دی جاتی ہے۔  
علی الاعن ایک گھنٹے دوپہر کے کھانے میں دو گھنٹے  
شام کے کھانے میں ۴ تا ۵ گھنٹے  
پھر ایک یا دو گھنٹے دن کے آخری وقت کے کھانے میں دی جاسکتی ہیں یہ مقدار شدت  
حالات ہی میں مناسب ہوتی ہے۔  
(۲) جذباتی متلی میں  
ایک یا دو گھنٹے سفر کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے نوش کرائی جاتی ہے پھر بطور حفاظت ایک  
معتاد اور دی جاتی ہے۔  
۱۲ یا ۱۴ دن تک بچوں کو بالغ فرد کی نصف مقدار دی جاتی ہے

یہ دوا باڈار میں ۲۵ ملی گرام فی گھی (۲۵ اور ۱۰ گھیوں کی مشینی) میں دستیاب ہوتی ہے اور  
یہ مادہ بی ڈی ایچ لمیٹڈ لندن نے پیش کیا ہے۔

## Synopsis

## ۱۳۔ سائنو پین

یہ ایک زبردست قوی تاثیر (انٹی ہٹائین) دوا ہے جو خفیف زہر بلا اثر رکھتی ہے اور  
نہایت عمدہ شافی علاج کی ذمہ دار ہے۔  
اپنے سریلک اثر ہونے کی وجہ سے یہ کم از کم زہر (حجم میں جمع ہو کر) پھر طور پر موثر  
ہوتی ہے اور اس طرح نہایت قابل برداشت ثابت ہوتی ہے۔  
بہر کیف یہ دوا ایک قابل اطمینان دفعہ حساسیت مادہ ہے اور کم سے کم مقدار میں بھی  
بہت موثر ہے۔ اور خاص طور پر مخالف اثرات سے مرہ ہے۔  
داعیات و امتکارات علاج :- یہ دوا مندرجہ ذیل حساسیتی عوارض میں عام  
تجویز کی جاتی ہے

- (۱) حساسیتی التهاب ملحمہ چشم (۲) عروقی حرکی التهاب الف  
(۳) تپ کا ہی (۴) حساسیتی دار الجلد  
(۵) اکڑیاسے پیدا شدہ خراش جلد (۶) جسمی التهاب جلد  
(۷) چینیں صفیہ (۸) طفحات دوا  
(۹) ڈنک مارنا اور کاٹنا (۱۰) شری (پتی اچھلنا)  
(۱۱) بخار دوا (۱۲) سیرم کی بیماری  
(۱۳) استہدائی صدمہ (۱۴) التهاب شعبہ بہ ہمراہ دمہ  
(۱۵) شعبی دمہ (۱۶) حمل کا نسیم  
(۱۷) سمندری متلی (۱۸) ہوائی متلی  
معتادگی اور طریقہ استعمال :- براہ دہن معتادگی :- اکثر مرہین کو صرف ایک  
گھی دن میں ۳ بار یا ۴ بار دینے سے صحت یاب ہو جاتی ہیں لیکن یہ زیادہ طویل مقدار میں بھی



دی جا سکتی ہے۔ بچہ پوری کی پوری نگہ لینی چاہیے اور خاص طور پر کھانے کے دوران میں تناول کرنی چاہیے۔ بچوں کو ان کی عمر کے مطابق دینی چاہیے۔  
جذریہ اکثر آج معتمدگی :- ان حالات میں جہاں فوری اثر مطلوب ہو وہاں دریدی یا درون حصلاتی راہ سے انجکشن کے ذریعے علاج شروع کرنا چاہیے (فیصدی دوا کا سو لوشن ۲ تا ۴ سی سی کی مقدار میں انجکٹ کیا جاسکتا ہے۔  
فرلحسی :- انجیکشن کا وزن ۰.۲۵ ملی گرام ۲۰ بچوں کا ٹیوب ۲۰ بچوں کا فلاسک۔  
۲ سی سی کا امپیل (فیصدی حملوں والا) ۵ امپیل کا بچن اور ۵ امپیل کا بچن دستیاب ہوتا ہے۔  
تختہ :- جے آر گیلی الین، اے اے باسل

Avil

۱۳۔ ایول

ایول ایک نہایت قابل برداشت انٹی ہشامین اور دافع حساسیت مرکب ہے جو ہشامی قوی تاثیر اور طویل الاثر دیر پا دوا ہے۔  
داعیات و اشارات علاج :- یہ مندرجہ ذیل امراض و دھارن میں ایک سکون بخش دوا ہے۔

- (۱) مزمن اور شدید شری
- (۲) کوئک کا اذیا
- (۳) اکڑیا۔ نار فاریسی
- (۴) تھریلا ٹوران جلد
- (۵) مختلف اسباب سے پیدا شدہ جسمی جلدی خراش جلد
- (۶) تھریلا التهاب جلد ڈھرنک
- (۷) حاملہ کا مرض جلد
- (۸) یرقان کی خراش
- (۹) کاٹھا، ڈنک مارنا
- (۱۰) ادویات سے بیش حساسیت
- (۱۱) سیرم کی بیماری
- (۱۲) لاسٹا جی بیماری

مندرجہ ذیل حالات میں نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔

- (۱) تپ کا ہی
  - (۲) شدید التهاب الف
  - (۳) عروقی حرکت کا التهاب الف
  - (۴) آنکھ کے حساسیتی امراض
  - (۵) دم
  - (۶) درد شقیقہ (آدھاسیسی)
  - (۷) عروقی جسمی علامت
  - (۸) مخاطی التهاب قوتوں
  - (۹) ادخال خون سے قبل بطور حفظ بالقدم
  - (۱۰) تھریلا لم کے دوران میں تختہ شقیقہ
  - (۱۱) لگنے بچیک، سٹیلا اور جل کا نسیم
  - (۱۲) التهاب جگر
- معتادگی اور طریقہ استعمال :- معتادگی انفرادی حیثیت سے طے کی جاتی ہے۔ بالغ افراد ۱۰ سال سے زیادہ عمر کے بچوں میں آدھاسیسی روزانہ ۲، ۳ بار دینا جاتی ہے اگر ضرورت ہو تو یہ معتادگی انجیکشن روزانہ ۳ بار تک بڑھائی جا سکتی ہے اور بچیاں کھانا کھانے کے بعد استعمال کرانی چاہیے۔ بعض اوقات اس دوا کی بڑی مقدار استعمال کرنے سے کسی قدر تکان پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا معتادگی طے کرنے میں خاص طور پر احتیاط رکھنی چاہیے اور اس لیے یہ دوا موثر کار چلانے والوں کو نہیں دینی چاہیے۔
- شدید حالات مرض میں علاج کے لئے امپیل کی ضرورت پڑتی ہے اس مقصد کے لئے ۲ سی سی کی مقدار میں مرض کی شدت کے مطابق روزانہ ایک یا دو بار انجکشن لگایا جاسکتا ہے۔ انجکشن درون حصلاتی راہ سے یا درون دریدی راہ سے سست رفتار سے لگایا جاسکتا ہے۔ بچوں کے لئے ۲ تا ۴ امپیل روزانہ ایک یا دو بار استعمال کیا جاسکتا ہے یہ علاج فوری اثر کا مرض پر قابو پانے کے لئے جاری رکھا جاسکتا ہے۔
- اس دوا کی ایک ہی معتادہ ۸ گھنٹے تک اپنا موثر اثر کرتی ہے پھر مرض کے کم ہونے پر ایول کی انجیکشن یا ایوی لیٹ استعمال کی جاسکتی ہے۔
- بچوں کے لئے چھوٹی ٹیکیاں villets
- دس سال کی عمر کے بچے کے لئے انفرادی معتادگی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے ان کو تجویز کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ۱۰ ملی گرام کی ایک انجیکشن دستیاب ہوتی ہے

## جلد پر چھڑکنے کے لئے سفوف

یہ مرہم میں شامل کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ عام طور پر دوسلین ۵، حصہ ۱ اور پوڈر ایک حصہ شامل کیا جاتا ہے۔ جلد پر لگانے کے لئے رسبیل دوا بھی استعمال کیا جاسکتی ہے پوڈر کو کسی سووشن میں ایک فیصدی کے تناسب سے ملا یا جاسکتا ہے یہ پوڈر زیادہ تر ہزار میں اچھے کا محلول کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

## قطرات چشم

یہ ایک یا ۲ فیصدی کا محلول استعمال کیا جاتا ہے جلد کی معمولی تکالیف کے لئے ایاد ۵ فیصدی کا محلول استعمال کیا جاسکتا ہے تمام جسم کو ماؤن کرنے والی حساسیتی تکالیف کے لئے ایاد دو فیصدی کے سووشن میں ۲۰ سی سی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس سووشن کو ہاتھوں پر لگایا جاسکتا ہے پھر خشک ہونے دیا جاتا ہے ۲ تا ۴ گھنٹے کے اندر ۲ یا تین بار لگانا کافی ہوتا ہے علاج کے دوران میں جسمانی غسل نہیں کرانا چاہیئے۔

## Avil Ointment

مرہم: مقامی استعمال کے لئے ۵ فیصدی کا ایول مرہم بھی دستیاب ہوتا ہے جو جلد کے حساسیتی امراض میں بخیر کیا جاتا ہے یہ خارش جلد، ڈنک مارنا، معمولی جلن، پیش کش اور التهاب الف میں جلد پر لگایا جاسکتا ہے۔

فرامی: عام طور پر دس ٹیوب کا ٹیوب، ۲ ٹیوب کا ٹیوب ۱۵ میپول (۲ سی سی کا ٹیوب) ۲ گرین پوڈر کا ٹیوب اور ۱۵ فیصدی کا مرہم کا ٹیوب دستیاب ہوتا ہے۔

ساختہ: ہرچٹ اے جی قادیب ورک فرمک فرٹ جرمنی

## Thephorinin

## ۱۴۔ تھیفورین (روچی)

یہ میٹیل فینائل ٹیٹرا بائیڈرو پائریڈین ٹارٹریٹ ہے جو غیر مسکن دافع حساسیت انٹی ہسٹامین مادہ ہے۔

یہ حساسیتی خلیوں کے علائقی علاج میں ایک موثر دوا ہے اور یہ دیگر انٹی ہسٹامین ادویات کی طرح ناس (دماغ) پیدا نہیں کرتی اور اس لئے یہ دائمی کام کرنے والوں، مشین چلانے والوں

اور موثر چلانے والوں کے لئے ایک پسندیدہ خاطر دوا ہے۔

اگر رات کی معاد دینے سے کسی قدر بے خوابی پیدا ہو جائے تو کوئی مسکن دوا دیا جاسکتی ہے مگر کیف اس کو کم مقدار میں دینے سے دافع حساسیت معالجات میں بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں اور اس سے ثانوی اثرات مثلاً ذیادہ پیرا ہوتے ہیں۔ اس سے اعصاب مضبوط کی کوئی بری علامت نمودار نہیں ہوتی اور اس کو زیادہ عرصے استعمال کرنے سے برا اثر نمودار ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر مندرجہ ذیل حالات میں بہت موثر ہے۔

## (۱) تپ کا ہی

## (۲) حساسیتی التهاب الف

## (۳) تشنجی، حرکی التهاب الف

ان امراض میں صرف ایک معاد استعمال کرنے سے ہی ۱۵ منٹ میں خارش و ریش بند ہو جاتی ہے یہ دوا امراض جلد میں خارش و گھاس کو سکون دیتی ہے اور ثانوی سرایت پر قابو پالیتی ہے۔ یہ دوا نزلہ و زکام میں بھی موثر ہے اور حساسیتی حملہ آور کو روک دیتی ہے۔ بالائے اعضاء تنفس کی خفا و خفاط کی حساسیت کو رفع کرتی ہے اور گرد و خبا را نمازت آفتاب، موسم کی تبدیلی و ماحول کی خرابی سے پیدا شدہ حالات کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے نزلہ و زکام میں اس کے ہرگز و طامن (ڈیپرائگان) براہ دہن یا ۲ گرام کی مقدار میں دی جاسکتی ہے۔

یہ دوا بندش حیف میں عارضی علامتی سکون پیش کرتی ہے اور فوراً در حیف کو رفع کرتی داحیات و اشارات علاج: یہ دوا مندرجہ ذیل حالات میں عام بخیر ہے۔

خارش و حساسیت کے سبب جلد کے خلل یعنی شدید اور مزمن اکریا، خارش فرج و مقعد

عصبی التهاب جلد، شری، آلوپک، التهاب جلد، دوائی التهاب جلد، سیرم کی بیماری وغیرہ

کامنڈ وڈنک: بچھو، متنا، بھر، جبکی اور کیرے کوڑوں کا کاسٹا، تپ کا ہی حساسیتی

التهاب الف، حمی الف

حساسیتی التهاب جوف الف اور دمہ

نزلہ و زکام: یہ ابتدائی درجات میں فوری موثر دوا ہے



## غذائی حساسیت

حساسیتی درد سر، ہٹا ہین درد سر، درد شقیقہ  
ایڈرانی عسر ملت، دشواری چہن

دیگر معالجات کے ساتھ رعشہ و فالج لرزان میں بھی مفید ہے  
معتادگی اور طریقہ استعمال :- دراصل معتادگی کا دارنہ فرد کی حالت پر ہوتا ہے  
پہلے کم سے کم مقدار میں بخور کرنی چاہیے۔ پھر موثر معتاد قائم کر دینی چاہیے۔  
عام طور پر بالغ افراد کے لئے ۱۰ ملی گرام ہر ۲ گھنٹے بعد دی جاتی ہے (روزانہ تین گھنٹہ دی  
جاسکتی ہیں)، اگر ضرورت پڑے تو ۲۵ ملی گرام ہر ۲ گھنٹے بعد دی جاسکتی ہے۔  
بچوں کے لئے ۱۰ ملی گرام اٹھ گھنٹے بعد دی جاسکتی ہے۔ بزرگ و زکام میں ابتدا میں  
۱۰ ملی گرام کی ایک گھنٹہ دینی چاہیے۔ لیکن کل مقدار ۵۰ ملی گرام سے زیادہ نہ ہونی چاہیے اس کے  
ہمراہ دامن سی ایک گرام ناک دی جاسکتی ہے۔  
رعشہ میں ۲۵ ملی گرام کی ایک گھنٹہ (روزانہ ۳ گھنٹے دی جاسکتی ہیں)، دیگر ادویات کے  
ہمراہ دی جاسکتی ہے۔  
یہ دوا ۱۰ ملی گرام کی گھنٹہ (شکر غلاف دار) ۲۰ میچوں کی شیشی اور ۲۵ گرام ۵۰ میچوں  
کی شیشی میں دستیاب ہوتی ہے۔

## تھیفورین کے مرکبات

Thephorin Ointment

۱۔ تھیفورین آئنٹمنٹ

یہ تھیفورین ۵ فیصدی کا مرجم ہے جو متبادل پانی میں قابل حل جزو اعظم ہے تیار کیا گیا ہے  
یہ مرجم دافع خراش جلد، دافع ہٹا ہین اثر اور مقامی خدر جلد ہے یہ دیگر انجی ہٹا ہین مرجموں سے  
زیادہ دافع خراش ہے اور بہت ہی موثر ہے صرف ایک بار لگانے سے خراش سے فوری نجات  
دلاتا ہے۔ یہ مرجم کپڑوں، کپڑوں، پچھو بھڑ، نکتیا وغیرہ کے کاٹنے میں جادو اور خیریت انجیز سکو  
پیش کرتا ہے۔

## داعیات اور اشارات علاج :- خراش جلد اور جلد کی حساسیتی نکالیف شٹا

حصی الہتاب جلد، حساسیتی نارفا رسی، خرمن تماس الہتاب جلد، لچن آسا اگر یا خراش و جلد  
دمقعد و فرج، شری، دوا کا الہتاب جلد، جلدی ضرر کے بغیر خراش و جلدی، ہٹا ہین کی گھنٹہ چکر کا،  
کاٹنا وغیرہ :-

احتیاطیں :- یہ مرجم شدید الہتابی، ارشاسی، یا پیپ دار (صدیری) جلدی حالتوں کو  
لے بخور نہیں کیا جاتا۔ بعض مریضوں میں یہ عرصہ دراز تک استعمال کرنے سے حساسیت پیدا کر  
سکتا ہے اگر ایسی کوئی امارت دافع ہو جائے تو اس کا استعمال روک دینا چاہیے۔  
معتاد اور طریقہ استعمال :- یہ مرجم مقام ماؤٹ پر لگا دینا چاہیے روزانہ کئی بار  
لگایا جاسکتا ہے۔ یہ مرجم ۳ گرام کے ٹوب میں دستیاب ہوتا ہے۔

۲۔ تھیفوری ٹیس  
یہ ۱۰ ملی گرام تھیفورین کی تھیفوری ٹیس ہے جو بچوں میں استعمال کی جاتی ہے اور ۲۰ میچوں کی شیشی  
میں دستیاب ہوتی ہے

Seventol

## ۱۵۔ سوونٹول

یہ اینٹینل این ہنرل ۴۰ اینڈا متیل پائیریدین ہے جو ایک زبردست دافع حساسیت

مادہ ہے۔

فعل :- سوونٹول ایک قابل اعتماد دافع خراش جلد دوا ہے اور ہٹا ہین سے پہلے

رد عمل و پیش حساسیت و حساسیتی عوارض و خراش کے لئے فوری سکون بخش دوا ہے

یہ ہٹا ہین ایسے ٹل کو لین کے برخلاف موثر ہے اور تندرست افراد پر اس کا تجربہ کر کے دیکھا

گیا ہے۔ اسی وقت پر بچوں کی گردش کی آزمائش کی جاتی ہے حیوانات میں اس دوا کا انجی ہٹا ہین

تجربہ کیا گیا ہے۔ خنزیر کی آنٹوں کو علیحدہ نکال کر اس پر اس کا تجربہ کیا گیا۔ خنزیر کے شعی قشعہ

خونگوشی کے کان پر عروقی اثر اور بلیوں کے خون پر تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے

بہر گشت یہ دوا خنزیر کی حساس زدہ آنٹ پر اسٹندانی رد عمل رکھتی ہے اور اس کے

## سوونٹول کے مرکبات :-

### (۱) سوونٹول جلی Soventol Jelly

یہ مرہم جیسی دوا ہے جو جلد کی حساسیتوں میں لگائی جاسکتی ہے خواش جلد، اکڑیا، کاٹاؤنگ مارنا، امتحان، التهاب جلد اور نمازت آغاب میں مفید ہے۔

### ۱۴۔ کیلسی لیوونین Caiciluvine

یہ پاروولی ایجنٹ فیضائل نیزائل ایماین ہائیڈروکلورائیڈ کیلیم گلوکونیٹ کا مرکب ہے جو سب سے اعلیٰ دافع حساسیت دوا ہے۔

یہ دوا جزاء کا ایک زبردست اثر آفریں مرکب ہے جو اپنے مخصوص دافع حساسیت اثرات کا حامل ہے اور کم سے کم مقدار میں پوری قوت کے ساتھ اثر کرتا ہے یہ نہ صرف دافع حساسیت ہے بلکہ تمام الہائی حالات میں بھی مفید ہے۔

فصل :- یہ دوا پانچ مخصوص فوائد رکھتی ہے۔

(۱) اس کا انجکشن نہایت قابل برداشت ہے اور مقامی خدر نہ کھتا ہے درون ہضلائی۔ انجکشن لگنے سے درد وغیرہ نہیں ہوتا۔

(۲) کم سے کم مقدار میں دینے سے پوری شافی تاثیر پیدا کرتا ہے اور زہریلے اثرات سے مبرا ہے روزانہ ۱۲ امپیل استعمال کرتے سے بھی کوئی خاص زہریلا اثر پیدا نہیں ہوتا۔

(۳) مامون الاثر اور وسیع الاستعمال شفا بخش دوا ہے۔

(۴) مسکن خواش جلد اور نہایت موثر ہے۔

(۵) دافع حساسیت اور مسکن ہے۔

داعیات اور اشارات علاج :- یہ خاص طور پر مندرجہ ذیل حالات میں مفید اور موثر ہے اور تاثیراتی لحاظ سے کامیاب نتائج کی حامل دوا ہے

(۱) تمام اقسام کی حساسیت خصوصاً حساسیتی امراض جلد، توران دوا، شری، انٹی بیوٹک ادویات سے رد عمل، شعلی بیماری داحمر جلد

برخلاف محافظ دوا ہے۔

یہ دوا دافع نسخ صفات بھی رکھتی ہے اور نرم عضلاتی نظام پر فوراً اپنا عمل کرتی ہے اور اس طرح نظام عصبی پر اپنا اثر دکھاتی ہے۔

یہ دوا جاذبوں میں پلوکارپین سے محرک سیلان رقی (کثرت لعاب) کو بڑھاتی ہے اور ہسٹامین کے اثر کے خلاف کام کرتی ہے۔

مزید برآں اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دوا نہایت قابل برداشت اور داعیات اور اشارات علاج :- یہ دوا مندرجہ ذیل حساسیتی عوارض و ظو درد عمل اور پیش حساسیت حالات میں استعمال کی جاتی ہے ان حالات میں یہ دوا دافع ہٹا۔ اثر کرتی ہے اور ہسٹامین جیسے مادوں کے خلاف کام کرتی ہے۔

(۱) اولاً یہ دوا خواش جلد کو دفع کرتی ہے اور بخون گردش پر مفید اثر رکھتی ہے غشا خلی کے التهاب اور دردم کو دور کرتی ہے۔

(۲) دوسرے یہ دوا مندرجہ ذیل حساسیتوں میں عام تجویز کی جاتی ہے۔

(۱) مرض مصل۔ سیرم کی بیماری (۲) التهاب غشا و خلی

(۳) شری (پتی اچھلنا) (۴) اسٹروکس

(۵) تب کا ہی، حمی، القش (۶) کوٹنگ کا اذیا

(۷) حساسیتی التهاب شعبہ (۸) دوا کا دوران جلد

(۹) خواش مقعد و فرج (۱۰) حاملہ کی مہلک تے

معتادگی اور طریقہ استعمال :- اس دوا کی عام معتاد ایک ٹیکہ ہے۔ یا ایک امپیل کا سیال درون عضلاتی راہ سے انجکٹ کیا جاسکتا ہے اگر ضرورت پڑے تو یہ معتاد دہی کیا جاسکتی ہے اور ۴، ۵، ۶ گھنٹے بعد اس کو مکرر دیا جاسکتا ہے

فراہمی :- یہ دوا بہ شکل ٹیکہ (پہ گریں کی ٹیکہ) ۱۰، ۲۰ ٹیکوں کے ٹوب میں اور اسی سی کے امپیل میں دستیاب ہوتی ہے۔

ساختہ :- تال۔ اسے جی۔ کیمیکل درکن۔ برمنی



(۲) دیگر جلدی امراض جو عرقی رقت پذیری کے بڑھنے کے ساتھ ہوں۔

(۳) متاعوں کے اثرات، اوراق

(۴) متعدد اقسام کی خراش جلد

(۵) کائناٹک مادہ (گزیدگی حیوانات و طائر)

(۶) وہ حالت جس میں انٹی ہسٹائین اور کلسیم تجویز کرنا مطلوب ہو۔

(۷) سیرم کی بیماری اور سیرم کا صدمہ

(۸) حاملہ کی مثنیٰ اور فتنے

معتادگی اور طریقہ استعمال :- مریض کی شدت و قسم کے مطابق اس کو استعمال کرنا چاہیے، عام طور پر ۱۰ سی سی کا امپیل درون ہتھلائی یا درون دریوی راہ سے انجکٹ کرنا چاہیے! درہ بڑی مقدار میں بہت آہستہ سے داخل حجم کرتے چلیے۔

روزانہ ایک امپیل استعمال کرنا کافی ہوتا ہے لیکن شدید حالات میں بلا خوف و خطر ۲، ۳ امپیل روزانہ استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

متوسط حالات میں شکر خلاف دارمکیاں دینی چاہئیں روزانہ ۳ ٹیچاں ۳ بار کر کے دی جاسکتی ہیں متوسط متعادتین ٹیچاں روزانہ ہے۔

پیش کش :- یہ دوا ہر شکل ٹیچہ خلاف دارمکیاں کی شکل میں ۲۰ ٹیچوں کے بکس میں اور اسی ہی امپیل کی شکل میں ۱۲ امپیول کے بکس میں دستیاب ہوتی ہے

ساختہ :- سی ایف ایو ہرنگرائڈ سنٹر، نان ایم جونی

۱۷۔ ڈوکسی لائین ٹیٹ ڈوکسی لائین ٹیٹ

Decapryn

یہ بھی ایک دافع حساسیت (انٹی ہسٹائین) دوا ہے جو ۵/۱۲ ملی گرام اور ۲۵/۲۵ ملی گرام ٹیچہ شکل میں اور شربت کی شکل میں امریکی ہی میں دستیاب ہوتی ہے

دستخط :- میرل، ایو، ایس، امریکہ

۱۸۔ میتھاپائریلین ہائیڈروکلورائیڈ  
Methapyrilene Hyd  
Thenylene

یہ بھی ایک دافع حساسیت مادہ ہے جو ۵۰/۱۰۰ ملی گرام ٹیچہ کی شکل میں اور مقامی استعمال کے لئے دو فیصدی کریم کی شکل میں دستیاب ہوتا ہے یہ ابھی تک ہندوستان کے بازار میں نہیں آیا

۱۹۔ پروفن پائری ڈائین  
Prophenpyridamine  
Trimeton

یہ بھی ایک زبردست دافع حساسیت مادہ ہے اور ۵۰/۲۵۰ ملی گرام ٹیچہ کی شکل میں دستیاب ہوتا ہے اس کا جدید مرکب نیوٹرائی میٹن نام سے شینگ کارپوریشن بلوم نیوجرسی امریکہ نے پیش کیا ہے۔ جو بہت موثر ہے۔

۲۰۔ ٹھون زائی لائین ہائیڈروکلورائیڈ  
Tnauzylamine Hyd

نیو ہٹرامین ہائیڈروکلورائیڈ  
Neo-Hetramine

یہ بھی ایک نہایت عمدہ دافع حساسیت دوا ہے، ۵۰/۱۰۰ ملی گرام کی ٹیچہ، شربت اور دو فیصدی کی کریم مقامی استعمال کے لئے دستیاب ہوتی ہے لیکن ابھی تک نایاب ہے۔

۲۱۔ کلوروفن پائری ڈائین  
Chlorphenpyridamine  
Chlor-Trimeton

یہ ایک جدید قوی تاثیر سرجی الاثر انٹی ہسٹائین مرکب ہے جو حاسیتی عوارض میں تجویز کیا جاسکتا ہے مثلاً

(۳) حاسیتی اکڑیا

(۴) عرقی ٹھنسی

(۱) تپ کا ہی

(۲) سیلان الف

مذکورہ بالا حواض میں ایک خاص دوا ہے اور مندرجہ ذیل حواض میں بہت مفید ہے۔

- (۱) سیرم کی بیماری  
(۲) سلفا ادویات کی حساسیت  
(۳) کاٹنا وڈنک مارنا  
(۴) شجی و تھجی دہ  
(۵) آدھاسیسی

معتادگی اور طریقہ استعمال :- یہ دوا ۴ ملی گرام (تھجی روزانہ ۲، ۳ بار دی جاسکتی ہے ۶ سال کے بچے کے لئے ۲ ملی گرام بلکہ بچہ دی جاسکتی ہے اور دوسرے حسلائی راہ سے شدید حالات میں اسی سی کا امپیول انجکٹ کیا جاسکتا ہے  
فرائض :- یہ دوا ۲۰ میچوں کی نشانی اور ۳ امپیول کے بچوں میں دستیاب ہوتی ہے  
ساختہ :- شیزنگ کارپوریشن بلوم فیلڈ نیوجرسی امریکہ۔

Methapyrilene

Thenylpyramine

Histadyl

Semikon

Thenylene

۴۲۔ میتھاپائریلین

تھنیل پائرامین

ہسٹاڈائل

سیمیکون

تھنیلین

یہ ایک بہترین دافع حساسیت مادہ ہے جو عام طور پر ہسٹاڈائل نام سے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔

فعل :- یہ دوا حساسیتی حواض اور تپ کا ہی میں استعمال کجانی ہے اور بہت موثر دافع حساسیت دوا ہے۔

داعیات و اشارات علاج :- یہ دوا مندرجہ ذیل حساسیتی حواض و خلل میں

موثر ثابت ہوتی ہے۔

(۱) شدید شری میں ہسٹاڈائل ۲۰ تا ۳۰ ملی گرام کی مقدار میں روزانہ ۳ بار درون حسلائی راہ سے دینا بہت ہی مفید ہے۔

- (۲) تپ کا ہی  
(۳) غذائی حساسیت  
(۴) اے سی ایچ انولین اور لیوراکٹرکٹ سے حساسیت  
(۵) شجی دہ

معتادگی اور طریقہ استعمال

درون حسلائی اشراب :- عام طور پر شدید حالات میں ایک سی سی کا امپیول دینا حسلائی راہ سے استعمال کیا جاتا ہے۔

براہ دہن :- ہسٹاڈائل پلووز ۲۵ ملی گرام روزانہ ۲، ۳ بار براہ دہن پانی کے ہمراہ دیا جاسکتا ہے یہ متوسط حالات میں بہت مفید ہے ۲۵، ۵۰ اور ۱۰۰ ملی گرام کی پڑیاں استعمال کجانی ہیں۔  
۵۰ گرام کی ٹبلیٹ بھی استعمال کی جاسکتی ہے اور براہ دہن استعمال کے لئے بچوں کے لئے شربت ہسٹاڈائل بھی ایک سی سی کی مقدار میں دیا جاسکتا ہے۔

۵۰ فیصدی کا سولوشن آنکھ اور ناک میں ڈالا جاسکتا ہے ۲ فیصدی کی ہسٹاڈائل کریم جلد پر لگائی جاسکتی ہے اور دو فیصدی کا سولوشن جس میں زنک آکسائیڈ ۴ گرام اور ہسٹاڈائل ۲ گرام شامل ہوتی ہے جلد پر لگایا جاسکتا ہے

۵۰ فیصدی کا مرہم آنکھ کے لئے دستیاب ہوتا ہے  
ہسٹاڈائل کے دیگر مرکبات :-

۱۔ ہسٹوکلوپین Histo-clopane

یہ ہسٹاڈائل اور کلوپین ہائیڈروکلورائیڈ کا مرکب ہے جو ہسٹاڈائل سے دو گنی تاخیر رکھتا ہے

یہ آمیزہ زود آفرین اور اثر آفرین ہے اور ہر دافع حساسیت دوا سے دو گنا موثر ہے۔  
یہ تپ کا ہی (تھجی القش) - التهاب الفحاشی (اور دیگر حساسیتوں میں ایک فوری سکون بخش دوا ہے اس کا استعمال دن کے وقت میں بھی کامیاب ہے اس کو لیڈاز طعام دن میں ایک





# انٹی ہسٹائین ادویات کے فعل

← (۶) :- →

ان ادویات کا خاص فعل ہسٹائین کے مفاد براہ راست اثر کرنا ہے۔ ان کا یہ فعل ہسٹائین سے متاثرہ خلا یا پر ہوتا ہے۔ اور اس فعل کی مثال دوسری ادویات میں بھی ملتی ہے مثلاً آئروپین اور ایسٹین کل کو لین کے مابین متفاد کیفیت نمودار ہو جاتی ہے اور ایڈرسے نزہک بلو کنگ ادویات اور آڈرینا کے مابین متفاد حالت پیدا ہو جاتی ہے ادھر پراسینو ہنز ونگ الیڈا اور سلفا ادویات کے مابین بھی تفاد ہے۔ اسی طرح ہسٹائین مفاد کیفیت ہے۔ جو ہسٹائین انٹا گو نزم کہلاتی ہے بہر کیف ہر لحاظ سے انٹی ہسٹائین مرکبات نرم حصار پر ہسٹائین کے تشبیہ پیدا کرتے والے اثرات نجات دلاتے ہیں اور ہسٹائین سے پیدا شدہ شریان کے القابض اور عروق پر اس کے اثرات اور اس کے افراد پیدا کرنے والے اثر سے بھی بچاؤ کرتے ہیں۔

تجرباتی لحاظ سے انٹی ہسٹائین کی جانچ کرنے میں بہت سے طریقے اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً ہسٹائین زدہ فضا سے متاثر خنزیر میں ہسٹائین سولوشن بے جینی، تنگی نفس (بہر اور دورے جیسی علامات پیدا کر دیتا ہے۔ ان علامات کو اس جانور میں انٹی ہسٹائین (مضاد ہسٹائین) کے ایک انجکشن سے روکا جاسکتا ہے۔ یہی خنازیر گھوڑے کے سیرم یا دیگر بیرونی پروٹین سے بھی حساس کیا جاسکتا ہے۔ لہذا انٹی جن کے اثرات کے بعد انٹی ہسٹائین دوا کا انجکشن لگانے سے خطرناک استہذا کو فوراً بحال کیا جاسکتا ہے اسی طرح کسی حیوان میں ہسٹائین کی کوئی خطرناک مقدار دینے سے کسی ہسٹائین کی کافی مقدار دے کر بچاؤ کیا جاسکتا ہے ان تدابیر کے علاوہ کسی خنزیر کی آنت کا بھڑا یا زگوش کی آنت کا ریشہ لے کر دوا کا مفاد ہسٹائین فعل معلوم کیا جاسکتا ہے۔

بہر کیف دافع حساسیت حرکات کی وسعت یہ ہے کہ ہسٹائین استعمال کئے ہوئے تاثیراتی اثرات کو بحال کر دیتے ہیں اور استہدائی رد عمل کو فوراً دور کر دیتے ہیں لیکن انٹی ہسٹائین ادویات ہمیشہ ہی ہسٹائین کے اثرات کو قطعی طور پر مسدود نہیں کرتے ہیں بلکہ بعض مخصوص اثرات کو کسی

حد تک ختم کر دیتے ہیں یعنی محدہ کی رطوبت کی کوٹھڑیوں پر ہسٹائین کا اثر محرک کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ادویات بعض دیگر مخصوص افعال بھی رکھتی ہیں جو نہریلے اور مخالف اثرات کہلائے جاتے ہیں جو اکثر علاج و معالجہ میں پیش آتے ہیں۔

ان ادویات میں سے بعض مثلاً پائیزا بنز امین وغیرہ آئروپین جیسا خفیف اثر رکھتی ہے اور انٹرگان تو آڈرینالین کے جوابی اثر کو قوی کر دیتی ہے اور آڈرسے نزہک اعصاب، کو حرکت میں لے آتی ہے اور بعض دیگر ادویات گرد مثلاً رگی اعصاب پر اثر کرتی ہیں بہت سی انٹی ہسٹائین ادویات کسی قدر مقامی تخدیر اثر رکھتی ہیں جن کو بطور دافع خارش استعمال کیا جاتا ہے اور جلد کی تسکین کا بھی پیدا کرتی ہیں۔

زہریلے طواہر :- ان ادویات کے زہریلے اثرات مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) اعصاب و جذبات کا دباؤ

(ب) خشی و لغاس

(ج) سیالان عذاب

(د) قے

یہ زہریلے اثرات متواتر یا کم تر ہو سکتے ہیں مرکب کی مقدار کے مطابق ان کا اثر زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور بعض حیوانات میں فرق ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ حیوان میں کچھ زیادہ اثر نہ ہو بہر کیف کوئی بھی انٹی ہسٹائین دوا شدید ترین زہریلی نہیں ہے اور ممکن ہے ہر دوا شافی تاثیر کی مالک ہو۔

## ۷۔ زہریلے رد عمل اور ناخوشگوار مخالف اثرات

Toxic Reactions and undesirable Side Effects

مضاد ہسٹائین ادویات کے استعمال سے ان کا عام ہونا ممکن نہیں ہے بہت سے رد عمل ظہور میں آ سکتے ہیں۔ خاص طور پر ڈائی فن ہائیڈر امین (بیتا ڈیل) سے نمایاں ممکن اثر نمودار ہو سکتا ہے لہذا اس کو خود بخود چلنے والے موٹر کار وغیرہ میں مصروف مریضوں کو استعمال نہ



کرانا چاہیے کیونکہ اس کے استعمال سے خود گی پیدا ہو کر حادثہ رونما ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے  
انٹرگان اور پائیرالائن سے بھی ایسا ہی واقعہ ہو سکتا ہے۔ ٹرائی پلایین سے ڈرامک ایسا ہوتا  
ہے ان ادویات سے خود گی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض شدید حالات میں تو خفی بھی پیدا ہو سکتی ہے  
نظام حسی پر ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوا دوسرا اھٹار کی لچک میں دقت، ذہن کا باطل ہونا، لپٹ  
چڑا پن اور کبھی کبھی مرگی کے سے دور پیدا ہو سکتے ہیں۔

اھٹانے، ہضم پران کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہستی، مڑوڑ شکم اور درست جاری ہو جاتے ہیں لیکن  
یہ اثر صرف ان ہی ادویات سے ہوتا ہے جو دافع تشنج صفات نہیں رکھتی مثلاً ٹرائی پلایین اور  
پائری بنزائین وغیرہ۔ ان ادویات کے استعمال سے التهاب جلد اور اگرے نولوسائٹوسس بھی  
پیدا ہو سکتا ہے۔

## انٹی ہسٹائین ادویات (مرکبات) کا معالجاتی استعمال

اور

### اشارات علاج

آج کل انٹی ہسٹائین مرکبات (مندرجہ مادے) نہایت وسیع الاستعمال ہیں اور شافی لحاظ  
سے حساسیت میں اور اس کے متعلق ہسٹائین کے جسم میں آزاد ردی کے سبب علامات کو سکون دینے  
کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں۔

ان کے دو اہم تاثیراتی فوائد ہیں:-

- (۱) یہ ہسٹائین کے اثرات زائل کرنے کے لئے ایک بہترین ہمتیار ہیں
- (۲) ہسٹائین یا دیگر کسی سبب سے پیدا شدہ بے قاعدگی معلوم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ  
اور تشخیص کا آلہ ہیں۔

یہ ادویات و مرکبات مندرجہ ذیل حوارج و خلل و امراض کا علامیاتی علاج ہیں

(۱) شری۔ پتی اھچلنا۔

(۲) عروقی عصبی اذیماء۔ رگوں، پٹھوں اور جیم کا بھیج جانا

(۳) موسمی حساسیتی التهاب الف، سردی یا گرمی، برسات کے موسم میں ناک سے ریش جاری  
ہونا اور چھینک لیا آنا۔

(۴) سیرم اور کسی حساس دوا کا رد عمل

متعدد وسیع الاستعمال سیرم اور پتی سلین، اسٹریٹوماٹی سین، انولین لیوراکٹرکٹ کے  
رد عمل پیدا ہونا۔

(۵) حساسیتی قسم کا کوئی دوسری قسم کا رد عمل مثلاً

دودھ انڈا، پھل کھانے سے حساسیت کا اھٹارنا، پھلوں کو سونچنے، گھاس پھوس کے  
چھونے اور کچھو کھڑکے کاٹنے سے کوئی رد عمل اھٹا کر ہونا۔

(۶) یہ ادویات کبھی کبھی دسے میں بھی معید ہوتی ہیں مان حوارج میں انٹی ہسٹائین ادویات  
کی شفا یابی کا فیصدی تناسب حسب ذیل ہے۔

شری اور مقامی التهاب جلد میں ۸۰ فیصدی تقریباً

موسمی تب کاہی میں ۵۰ فیصدی تقریباً

دسے میں ۱۰ فیصدی تقریباً

ادویات کے حساسیتی رد عمل کے مریضوں میں یعنی پتی سلین، اسٹریٹوماٹی سین یا سیرم  
کے رد عمل میں تکلیف دہ خراش کو دور کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔

حساسیتی قسم کا درد سر بھی انٹی ہسٹائین ادویات سے کا فور ہو جاتا ہے مگر کیف ان ادویات  
کا اثر محض درد دیر پا نہیں ہوتا اور حساسیتی حوارج کے تدارک میں حساسیت دور کرنے کی تلخیص  
بھی بروے کار لانی چاہیئے

زکام عام کا علاج:- آج کل امریکہ و برطانیہ میں حساسیتی زکام کو دور کرنے کے لئے  
عوام میں ان ادویات کی زبردست تشہیر کی جا رہی ہے اور ان کو زکام کا شافی علاج بتلایا جا رہا  
ہے۔ دراصل اس امر کی ابھی تک کوئی صحیح شہادت نہیں مل سکی ہے اور صحیح شفا یابی کے صحیح اعداد و  
شمار کا ہی پتہ چل سکا ہے۔

دراصل زکام عام اھٹار نفس کی خفا و غماطی کا ایک نر لاتی عارضہ ہے جو مندرجہ ذیل

اسباب سے پیدا ہو سکتا ہے۔

(۱) حساسیتی رد عمل سے

(۲) جراثیم اور قثب کی مراثوں سے

(۳) ممکن ہے جسمانی ردغالی عوامل سے بھی نمودار ہو جائے

ظاہر ہے انٹی ہسٹامین مرکبات زکام پر کوئی خاص اثر نہیں کرتے لیکن صرف حساسیتی ریزش کے مرض کے اثرات کو فروغ دنا نکل کر دیتے ہیں۔ لہذا اس جسمانی تکلیف یعنی درد و بخار اور درجہ حرارت کے ارتقاع کو کم کرنے کے لئے انٹی ہسٹامین انٹی جیک (ہند جس ہند عالم) مرکب استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اور زکام کے علاج کی دیگر مذاہیر بر دے کار لائی جاسکتی ہیں۔

جذبائی مہنتی کا علاج: آج کل سمندری مہنتی، کار و موٹر کی مہنتی و ایکا کی رد کرنے کے لئے ایک جدید ترین مرکب ڈائی مین ہائیڈری نیٹ کلور و مینوفنی نیٹ (ڈی مین) دستکتر بروز ویکیم بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ دوا کسرے یا مائٹروجن مشارڈ کے استعمال سے پیدا شدہ خفیانہ راکائی گلوکودر کرتی ہے

کھانسی کا علاج: آج کل خواش خلق اور شعبہ ریہ کی حساسیتی تکالیف کو دور کرنے کے لئے انٹی ہسٹامین ادویات کا سہارا لیا جاتا ہے اور سیرپ کوڈین کے ہمراہ سیرپ خزانہ شال کیا جاتا ہے اور دمہ کی حساسیتی کھانسی زکام کی حساسیتی کھانسی اور التهاب شعبہ کی کھانسی کو پرسکون کرنے کے لئے سیرپ فسن ڈل ساختہ سے امیڈیکر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔

انٹی ہسٹامین ادویات سیرپ الفیڈرین کے ہمراہ بھی استعمال کجا سکتی ہیں اور بطور دافع تشخ ریہ مفید ہو سکتی ہیں۔

نکود

حکیم علی ضیاء احمد

## ۹۔ انٹی ہسٹامین نسخہ جشا

۱۔ بینا سین Benacine

بینا ڈرل ہائیڈروکلورائیڈ ۲۵ ملی گرام ہائیوسین ہائیڈروبروڈائیڈ پیم گین ان دونوں کو باہم ملا کر ایک کیپ شول میں بھر لیا جائے۔

یہ ایک بہترین مسکن دماغ و دافع حساسیت دوا ہے اور یہ رشتہ، فالج لرزاں، التهاب دماغ، پارکن سونزم، میں بہت مفید ہے سمندری مہنتی میں بھی دیا جاسکتا ہے ہر چوتھے گھنٹے آیا دو کیپ شول بہ ہمراہ پانی دیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ موٹر کار چالانے والوں کے لئے مناسب نہیں ہے یہ رشتہ میں سختی اور لرزہ کو کم کر دیتا ہے۔

۲۔ بینا ڈرل اور الفیڈرین مرکب:-

بینا ڈرل ہائیڈروکلورائیڈ ۲۵ ملی گرام الفیڈرین ہائیڈروکلورائیڈ پیم گین ڈیکسٹروز یا گلوکوز بہ حسب ضرورت

یہ کیپ شول میں بھر کر یا پڑیہ کی شکل میں براہ دہن دیا جاسکتا ہے یہ حساسیتی دمہ، کھانسی اور التهاب الف حساسیتی، تپ کا بی میں بہت مفید ہے، محرک قلب افح حساسیت اور دافع دمہ ۳۔ تھیفورین اور وٹامن سی مرکب:-

تھیفورین ۱۰ ملی گرام

ریڈاکسان وٹامن سی ۱۰۰ ملی گرام

دونوں کو باہم چیں کر پڑیہ میں دیا جائے ایک پوڑیہ پانی کے ہمراہ دن میں دوبار دی جا سکتی ہے یہ زکام عام کے لئے ایک تہایت عمدہ نسخہ دافع حساسیت اور دافع سرایت زکام ہے یہ ناک کی رینڈ کو خشک کر دیتا ہے اور مزید سرایت سے بچاتا ہے اور بہت مفید ہے۔



# قرابادینی مرکبات

ان کی مقداریں

- ۱۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۲۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۳۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۴۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۵۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۶۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۷۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۸۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۹۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۱۰۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام

۱۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام  
۲۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام  
۳۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام

- ۴۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۵۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۶۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۷۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۸۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۹۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام
- ۱۰۔ پشیمانی دھنیا ۱۰ گرام

حکیم علی ضیاء احمد

## ۱۱۔ حوالہ جات

جے ایچ برن صاحب

تاریخ تالیف: ۱۳۸۵

بسم الله الرحمن الرحيم

۴۱۔ بیچ آئی سنو صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة إلى السيد صاحب

\* 2014/10/10 \*

۱۵۴۰ واپس کے ہجرت نامہ، سن ۱۲۸۹ھ بمطابق ۱۸۷۳ء

۱۵۱) آردی ہنر صاحب اور ڈی ایم ڈب صاحب

الحمد لله رب العالمين

کتابخانه عمومی آیت الله العظمیٰ خراسانی

(۱۵) از حسن صاحب

"فِي الْمَدِينَةِ"

المجلد الثامن

۱۴۱۰ هجری قمری

\* ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ \*

*(Signature)*

(۷) ای آر لو صاحب

’افغانیستان میں امریکات کی تاخیرات‘

مسافر کو روٹی

(۱۸) فی آتشیر و صاحب

”حق پرستین ادوات کی تاثیراتی صفات“

مسألة في غير ذلك من غير التي شفاهايات ١٩٤٤ ص ١٤٤

(۱۹) جے بی وی ڈی آر ڈی صاحب

”اسی جیسا کہ زمین کے زہریے اثرات“

مجموعہ نثری، اور علمی، ادبی و تاریخی (۱۹۵۱ء) صفحہ ۲۷

۱۰۸ الف الف با تحمین صاحب الید

”مساجد میں اچھی میناریں عمارتیں“

نور بادکوبه ای که در میان من و شماست

۱۱۱۱ ایم ایڈیٹی کا رسالہ ”نیا ہمتی نئی“

حکیم علی ضیاء احمد



[illegible]

حکیم علی ضیاء احمد

۱۲۔ انہی ہمسایین ادویات

ان کے تجربات نام

کیا دی نام	تجارتی نام
اکلڑ میں	ان کشتیں
مردانہ سیناں ہاتھ لگا ہیں	اسیوند
گھوڑا ساجی رہا	دھانچہ والی
"	چوڑا دل
"	بست لکھی
گھوڑی پٹا پڑی ہیں	گھوڑی
گھوڑی پڑی لگا ہیں	گھوڑی کشتیں
گھوڑی پڑی رہی	گھوڑی
گھوڑی پڑی پڑی رہی	تیل پڑی
ساجی رہی	پیر رہی
ڈانکی من ہانک رہی	ڈانکی
ڈانکی من ہانک رہی	پٹا دل
ڈوڑی لگا ہیں	ڈوڑی لگا ہیں
میٹھی رہی	پیر رہی
میٹھی رہی	ڈوڑی

## ۱۳۔ حساسیتی خلل دوران کا دافع حساسیت علاج

### سہر علاج

#### Allergic Disorders and Anti-Allergy Therapy

ذیل میں اردو حرفتہجی کے لحاظ سے حساسیتی حوادث 'حساسیتی خلل' 'حساسیتی رد عمل' اور حساسیتی حوادث میں دافع حساسیت کا مختصر بیان کیا جاتا ہے ان کی خاص نشانات و تشخیص و علاج کے نکات بھی پیش کئے جاتے ہیں

### ۱۔ ادویات سے رد عمل

#### Reactions to Drugs

یہ ایک حساسیتی رد عمل ہے جو بعض اوقات مندرجہ ذیل ادویات کے استعمال سے پیدا ہو سکتا ہے: پینسلین، اسٹریپٹوماکس، سین، سلفا ادویات، لیوراکس، انسولین، اس رد عمل کی دوا قسم ہوتی ہیں۔ پہلے قسم میں تو بعض کی علامات قطعی سیرم کی بیماری کے مشابہ ہوتی ہیں یعنی بخاریتی اچھلنا، جھڑوں کا درد اور عدد کا مرض ہوتا ہے دوسری قسم میں جسم پر اکڑیاسا اور خرازی التهاب جلد سا ہوتا ہے۔

علاج: اگر کسی مریض میں پینسلین وغیرہ کا انجکشن لگانے سے معمولی سا رد عمل

ہو تو انجکشن لگانے سے کوئی انٹی ہسٹامین دوا (تھینورین یا انتھی سان جیہ) براہ دہن استعمال کر ادینی چاہیے اور اگر رد عمل شدید ہو تو دوا دینا چاہیے۔ یعنی دافع خراش جلد لوشن اور غسل استعمال کرنے چاہیے یا بنیاد ڈرل کا درد و عضلاتی انجکشن لگانا چاہیے اگر تداہیر میں ناکام ہو جائے تو بائیروکوریٹون کا دوں عضلاتی انجکشن لگانا چاہیے۔

### ۲۔ استہداف

#### Anaphylaxis

یہ ایک اصطلاح ہے جس کا اطلاق اس جلد لیوورٹیری کے جانوروں میں واقع ہونے والے

## ۱۴۔ اعضا رھیم کی حساسیت

### Gastrointestinal Allergy

یہ بھی ایک حساسیتی خلل ہے جو عام طور پر معدہ و المعایین واقع ہوتا ہے اس کی اہم علامات در شکم، تشنگی درد، غذائی حساسیت، الغصہ جاتی ہے یعنی اور تشنگی معدہ و المعایین اور کبھی کبھی اسہال درد شکم بھی ہوتی ہے۔ یہی اور تشنگی بھی ہو سکتی ہے۔ علاج: شکم کی علامات کو تاپوس لائے کے لئے، اور یا لین ۵ رسی سی کی مقدار میں انجکٹ کی جاسکتی ہے۔ یا براہ دہن انسولین کی کھجوری جاسکتی ہے جو ہر جگہ گھسے پھرنے دینی چاہیے حساسیت کے علامتی سکون کے لئے مندرجہ ذیل مفید نسخہ ہے۔

پروپیلرین ہائیڈروکلورائیڈ ۲۷ ملی گرام  
(نشارپ انیلڈو دھم)

اڈوپین سلفیٹ ۲ ملی گرام  
فینو یارٹون ۱۶ ملی گرام

بیکسپ شول میں کھر کر روزانہ ۳ یا ۴ بار دیا جاسکتا ہے ہبھی علامتوں کو سکون دینے کے لئے براہ گال سنڈو براہ دہن یہ شکل بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔ اس حالت کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے شدید حالات میں انٹی ہسٹامین ادویات زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتیں صرف نرم ہفٹلم

حساسیتی رد عمل پر کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر انٹی یوٹک ادویات اور سیرم کے استعمال کے بعد نمودار ہو سکتا ہے۔ علاج: حساسیت کی نشانات کم کرنے کے لئے ہسٹا ڈائل ۲۰ ملی گرام کی مقدار میں براہ دہن دیجئے یا سنڈو سٹین کیلیم کی جھاگدار مکیاں براہ دہن پلائیے۔

شدید رد عمل میں اور یا لین ۵ رسی سی کا انجکشن لگائیے اور بطور محرک قلب ایفیڈرین کی کھجوری براہ دہن دیجئے، ہبھی طور پر دینی کو دے کرنے کے لئے فینو یارٹون ۱۶ گرام کی مقدار میں براہ دہن استعمال کرائیے۔ جلدی خراش کے لئے کیلا میں لوشن جلد پر لگائیے اور دم جیسے مندرجہ رد عمل میں انسولین براہ دہن یا دروں وریہ راہ سے دیجئے۔

### ۱۵۔ اعضا تنفس کی حساسیت

Respiratory Allergy  
یہ عضو تنفس کی حساسیت ہے جس میں پت کاہی، تشنگی، دم اور کھانسی اور کالی کھانسی وغیرہ شامل ہیں (دیجئے حسب موقعہ امر اجن مذکورہ)۔

علی صا



کے درد میں یہ ادویات عارضی سکون دی سکتی ہیں اس مقصد کے لئے ہسٹینورین یا نیا اشرگان دلتھی سان، وغیرہ استعمال کیا جاسکتی ہے غذائی مٹلا اور حساسیت کو دور کرنا بھی سب سے ضروری ہے

### ۵۔ احضار بول کی حساسیت Urinary Allergy

یہ بھی احضار بولوں دیشیاب کے راستوں کی حساسیت ہے جس میں پیشاب بلن کے ساتھ پرتا ہے اور بار بار پرتا ہے تکلیف اور دقت کے ساتھ ہوتا ہے سلسل بول اور رات کا پیشاب بار بار آتا ہے حاملین بن ٹرڈ ہوتی ہے اداس کا اثر احضار تاسل تک عادی ہوتا ہے عطیٹ دقت باہری سیلان ارم خراش تاس، اور رحم کی آئین تک نمودار ہوجاتی ہے۔

یہ ایک پیچیدہ مرض ہے جس کی تشخیص بہت مشکل ہے اس حساسیت کی اہم علامات پر غور کرنے سے ہی اس کی شناخت ہوتی ہے اس کے اہم اسباب یہ ہیں۔

(۱) غذائی حساسیتیں

(۲) الکوحل سے حساسیت

(۳) لٹھوں سے حساسیت

(۴) موسم سے حساسیت

(۵) ادویات مثلاً ایسپرین، انٹی بایوٹک

ادویات سے حساسیت۔

علاج :- سب سے پہلے حملہ آور حساسیت کو دور کرنا ہے غذا مثلاً انڈا، دودھ اور میوے، ٹماٹر وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے ہر قسم کی شراب سے بچنا چاہیے کیما دی لٹھوں سے بھی بچنا چاہیے حساسیت کی علامتوں پر توجہ پانے کی کوئی انٹل ہسٹین دوا مثلاً سٹو سٹین کلیم براہ دین استعمال کرانی چاہیے۔ اور تمام دافع حساسیت تدابیر بھی بروئے کار لانی چاہئیں۔

### ۶۔ انٹی بایوٹک ادویات سے بیش حساسیت

Hypersensitivity to Antibiotics

متعدد دافع جراثیم دوائی بھی حساسیت احضار پیدا کر دیتی ہے جس کی اہم علامات شری، اپی اچھلا، خراش جلد اور توران جلد وغیرہ ہیں بینی سلیس اسٹریپٹوما سیس، اور یوما سیس سے خراش معقد پیدا ہو سکتی ہے۔ بخار، جوڑوں کا درد اور سیرج کی بیماری کا سادو عمل پیدا ہو سکتا ہے۔

علاج :- عفاقی تدابیر فوراً بروئے کار لانی چاہئیں۔ دافع خراش لوش یا غسل کرنا چاہیے اور کوئی انٹی ہسٹین دوا براہ دین استعمال

کرانی چاہیے۔ مریض کی بے چینی دور کرنے کے لئے ایڈیٹرین اور فنیو ماڈرن کامرکب براہ دین دیا جاسکتا ہے شدید جلالت میں دونوں عضلاتی راہ سے میناڈرل ۲۵ ملی گرام کی مقدار میں انجکٹ کیا جاسکتا ہے اگر اس سے ناکامی ہو تو اکثر پریل ساختہ آرم ردون عضلاتی راہ سے انجکٹ کرنا چاہیے یا ہائیڈرو کورٹی سون براہ دین پشکلی سے استعمال کرانی چاہیے ادھگو کو زدرون دریدی را سے انجکٹ کرنا چاہیے۔

بینی سلیس رد عمل کا تدارک یہ ہے کہ اس کا انجکشن لگنے سے قبل کوئی انٹی ہسٹین مرکب مثلاً سٹو سٹین کلیم یا ہسٹینورین استعمال کرانی چاہیے اور بینی سلیس کا رد عمل غور کے ساتھ مشاہدہ کرنا چاہیے اور اس کا انجکشن بجائے عضلاتی کے عضلاتیہ پر لگنا چاہیے۔ اور بینی سلیس سے حساسیت اٹھنے والے مریض میں نہایت احتیاط برتی چاہیے یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل بینی سلیس کا استعمال نہایت مامون و محفوظ بنا دیا گیا ہے اور سوائے پروکین بینی سلیس کا رد عمل بہت کم نمودار ہوتا ہے

### ۷۔ ادویاتی الہاب جلد Dermatitis Medicamentosa

جلد کا لٹخ یا توران جلد یا الہاب جلد دوا

سے یہ ایک شدید مزمن الہابی رد عمل ہے جو لٹخ و اقسام کی ادویات کے استعمال سے پیدا ہوتا ہے بعض ادویات کے جلد پلگنے سے الہاب جلد پیدا ہو جاتا ہے جو حساسیت قوم کا ہوتا ہے۔ کے ساتھ بخار اور درد مریض ہو سکتا ہے۔

علاج :- سب سے پہلے حساسیت پیدا کرنا ہونی دو کو دور کرنا چاہیے اور تمام حملہ آور جلد کی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے دیکھئے جاری کتاب جلدی امراض کا علاج، ہائیڈرو کورٹی سون جرم لگنے سے بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ پختہ پورہ کان دناک کے الہاب جلد میں فرو سگون دیتا ہے۔

### ۸۔ اذیمیا — ورم رخو Oedema

یہ ایک حالت ہے جس میں جہانی پھیران پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھئے عرونی عصبی اذیمیا

### ۹۔ الہاب الفحاسیتی Allergic Rhinitis

یہ ایک پیچیدہ علامت ہے جس میں لوشی بڑے الف (چھینکیر)، سیلان الف، رگرت نیشا، امٹا الف، دناک کا ٹھٹھانا، اور عموماً آنسو چہنم

اور التهاب حلق ہوتا ہے اس کا مترادف تپ کا ہی باقی افس ہے۔ (دیکھئے تپ کا ہی)

## ۱۔ التهاب الف عرونی

Vasomotor Rhinitis

یہ عرونی حرکت کے اعصاب پیدا شدہ ناک کا حلقی اذاس ہے جس میں ریزش الف ایتا الف التهاب الف ہوتا ہے اس کا مترادف بھی تپ کا ہی ہے۔ (دیکھئے تپ کا ہی)

## ۱۱۔ التهاب جلد متماس

Contact Dermatitis

یہ بھی ایک حساسیتی فعل ہے جو کیمیائی اشیاء رنگ آرائشی کی اشیاء رنگ و زنا اور نباتات اور دھات اور مقامی استعمال کی ادویات سے پیدا ہو جاتا ہے۔ لفظوں، انگلیشن کی ادویات، سلفا ادویات کو نین پادہ وغیرہ سے بھی ہو جاتا ہے اس کا فوراً نہایت شدید ہوتا ہے اور اگر کیا جیسا ہوتا ہے یہ مزمن شکل اختیار کر سکتا ہے۔

علاج :- مخصوص ارجن کا دھیر کرنا سے ضروری ہے حساسیت دور کرنے کے لئے جینا ڈرل ۵۰ ملی گرام کی مقدار میں براہ دہن دی جاسکتی ہے یہ مسکن اور دافع خراش اثر

کرتی ہے یہ سوتے وقت دنیا زیادہ مفید ہے دماغی سکون و تنویم کے لئے رکھورل ہائیڈریٹ ۷۰ پیگرن کی مقدار میں پانی میں حل کر کے دی جاسکتی ہے لیکن اس سے بھی حس زدگی پیدا ہو سکتی ہے دن کے دوران میں درد سراور کس مندی کے لئے ایسپرین ۵۰۰ گرام ہر چوتھے گھنٹہ دی جاسکتی ہے لیکن مرلین کو اس کی حساسیت سے بھی بیدار رکھنا چاہیے۔ جلد کی خشکی، اور ماسرخی دور کرنے کے لئے نرم مرلوب تولیہ سے پچا کرنا چاہیے اور بورک ایسڈ سوشن سے جلد کی تری دور کرنی چاہیے۔ اگر سراسیت زیادہ ہو تو بے سی ژے سین مریم لگا چاہیے۔ دیو فارم مریم بھی بطور دافع لگا دیا جاسکتا ہے۔

## ۱۲۔ التهاب جلد غیر مقامی

Atopic Dermatitis

یہ اگر کیا کا مترادف ہے۔ یہ ایک عام مرض ہے جو غذاؤں کی حساسیت سے پیدا ہوتا ہے بچوں، بالوں، عورتوں کو مبتلا کر دیتا ہے۔

## سریری نشانیاں

جلد کے اضرار :- اس کے نشانات ٹھوڑی ہیشانی اور کھوٹری پر ہوتے ہیں بازوؤں اور ٹانگوں کی چبھوں پر بھی ہوتے ہیں۔ جلد کی تمام اندرونی سطح ماؤٹ ہو سکتی ہے صرف ہتھیلیاں

چہرے کے لئے نفعیاب استعمال کرنا چاہیے (۴) ، صابن دپاتی سے بچانا چاہیے کوئی قدر صابن مثلاً کوئیک یا ہسورم استعمال کرنا چاہیے

(۵) ، گرد و خبار، دھواں، دن، سٹیک اور پروں کے جلد پر لگنے سے بچائے تاکہ خراش جلد پیدا نہ ہو

(۶) زیادہ لباس اور زیادہ گرمائی کو بچا کر (۷) غذا اور آب و ہوا کا خاص خیال رکھئے۔

ایسی غذاؤں سے بچو اگر جن سے حساسیت پیدا کرتی ہو۔ اور مرض کو اجاڑتی ہو غذائی موافقت کا اندازہ سالقہ رودا دے معلوم ہو سکتا ہے غذا میں تمام ضروری حاجات غذائی شامل کر لی جاتی ہیں لیکن غذائی مقدار محدود رکھنی چاہیے۔ علاوہ ازیں اذیما جیاتی، ترشیت، ایلے آبی، قلت حیانتین، (فقدان دٹامن)، ادنی پلاٹا پروٹین، البیومن کی تبدیلی اور غیر طبعی عدم توازن اور اسٹال کا عمل وغیرہ پر خوب غور کرنا چاہیے۔

(۸) ادویات :- (۱) نافزی سراسیت کا مقابلہ کرنے کے لئے جدید ترین انٹی ہسٹامین استعمال کیجئے۔

(ب) شدید حالات میں عارضی سکون پیدا کرنے کے لئے کورٹی سون کا کوئی مرکب

تو لے ماؤٹ لائن ہوتے۔ اس کے اضرار میں خراش بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت بے چینی ہوتی ہے بعض اوقات یہ مرض صرف جلد کی چبھوں تک محدود رہ جاتا ہے۔

ابتدائی نشانیاں :- جلد پر توران سا ہوتا ہے۔ جلد مرلوب اور آبلے دار توران سے بھر جاتی ہے۔

دوسرے درجہ میں :- جلد خشک

بھڑکی کھرنڈارا اور کم توران دار ہو جاتی ہے اس

اکڑیا کے ساتھ دھبی سیلان یا لٹہ کا سادہ دورہ بھی ہو سکتا ہے

علاج :- (۱) عام تدابیر

(۱) توجہ اور ماسر :- مرلین کی بہت حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو ہر قسم کی غذائی حساسیت سے بچانا چاہیے۔ اس کو جلد

کھرچنے اور کھلنے نہ دینا چاہیے دن اور رات کے وقت بہت احتیاط برتنی چاہیے جلد کی چبھوں کی خراش سے بچانے کے لئے بھیکہ لگا دینا چاہیے

ناخون کو کتر داد دینا چاہیے۔

(۲) تسکین کے لئے بیٹا ڈرل کیپ ٹون براہ دہن استعمال کرنا چاہیے یا فینوبار بون کی بھیکہ رات کو سوتے وقت دینی چاہیے۔

(۳) سر کے لئے کوئی صاف بھیری ٹوپی اور

بیماری



ڈیٹا کو ٹرل، کور ٹرل، ہائپرڈوگمائیٹس، کور ٹرٹ وغیرہ، قابل قدر ثابت ہو سکتا ہے۔  
**مقامی علاج :-** (۱) جلد کی حساسیت کا قلع قمع کرنے کے لئے ہائپرڈوگمائیٹس، آنا ۲ فیصدی کا مریم، بہت موثر ثابت ہوتا ہے (۲) مرلوب افرا کے لئے کوئی انٹی ہسٹامین مرکب کا مریم مثلاً سائٹوپین اسٹینٹ وغیرہ استعمال کرنا چاہیے۔

(۳) مزمن، خشک، غلیظ، میٹم علاقوں کے لئے مریم کوکسٹا، کلمنٹ ۲ تا ۳ فیصدی والا نکالنا چاہیے۔  
 (۴) مستقل رنے والی رطوبت، دانی مٹھوں کے لئے ایلونیم ایسی ٹرٹ (بروز سوووش)، یو ایس پی مرگارت ثابت ہو سکتا ہے  
 (۵) اشاریہ باقہ (نشاستہ کاغذ) بھی مددگار ہو سکتا ہے۔  
 (۶) سرایت، فطرت اور حساسیت دہ کرنے کے دیونام کریم ساختہ سیدیا بھی مفید ہو سکتی ہے۔

### ۱۳۔ التهاب ملحمہ چشم حساسیتی

Allergic Conjunctivitis

یہ ایک شدید یا مزمن نزلاتی شکل ہے

جو عام طور پر کسی عظیم حساسیتی علامت کا ہی ایک جز ہوتی ہے یہ تپ کا ہی کی ایک اہم علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ پوٹوں کا متاس التهاب جلد ہو سکتا ہے۔

یہ آشوب چشم انفرادیات کے چھوٹے اور لگاتار سے بھی نمودار ہو سکتا ہے۔ مثلاً انٹی ہسٹامین ادویات کے آشوب چشم کے مریم، جبرے کے لئے غازے (فین پوڈر) یا خضاب لگاتار بھی ہو سکتا ہے یہ غذائی حساسیت اور موسمی کی حساسیت سے بھی ہو سکتا ہے

اس کی سب سے اہم علامت خارش چشم (آنکھوں کی کھجی ہٹ) ہے۔ آنکھوں کا قطر خوب متورم اور سرخ ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ ازبیا چشم بھی ہو جاتا ہے۔

**علاج :-** سب سے پہلے خارش اور سبب کو دور کرنا ہے اور تمام دافع حساسیت نظائر اختیار کرنے کی ضرورت ہے  
 (۱) خول چشم (پورک ایڈ واش، زنک سلفیٹ واش) استعمال کرنے سے کسی قدر سکون ملتا ہے۔  
 (۲) اگر خارش شدید ہو تو برف کا گدہ (کپڑے کی ٹشٹی ٹی) باندھنی چاہیے یا نیپتو کین وغیرہ کا سوووش لگانا چاہیے یا کوئی دوسری مختصر دوا

استعمال کرتی چاہیے۔

(۳) انٹی ہسٹامین ادویات مثلاً آن لائن ڈی لیبین، سائٹوپین۔ پیرازل براہ دہن استعمال کرنا چاہیے اور ساتھ ہی آڈرینالین ہائپرڈوگمائیٹس کا ۴ ہزار سی اے کے کا سوووش آنکھ میں پھینکا جائے۔  
 (۴) آنکھوں کی آبیاری، آنکھوں پر سیاہ چشمے لگانا مفید ہو سکتا ہے۔

### ۱۴۔ بخار دوا

Drug Fever

یہ بھی حساسیتی رد عمل ہے جو کبھی دوا کے استعمال کرنے سے لیکاریک اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس میں بخار دوسرے کسل بندی اور دوران جلد اور پی اچھلا سار دھن ہو سکتا ہے۔

**علاج :-** اگر مینی سلین دیکھائی دے اور ادویات اور ملحق ادویات سے یہ رد عمل ہے۔ تو کوئی انٹی ہسٹامین دوا استعمال کرائے اور بخار پیدا کرنے والی دوا کو فوراً روک دینا چاہیے اور تمام دافع حساسیت تدابیر بروئے کار لانی چاہیے اور انتہی سان کی تکمیل براہ دہن استعمال کرنی چاہیے (دیکھیے سیرم کی بیماری ادویاتی رد عمل وغیرہ)

### ۱۵۔ تپ کا ہی

Hay Fever

یہ ایک حساسیتی رد عمل ہے جو موسم بہار یا موسم گرما میں واقع ہوتا ہے اور پولینز (گھاس پھوس اور گرد و غبار) کے سبب ہو سکتا ہے۔

سریری علامات :-

خاص ان خاص علامات حسب ذیل ہو سکتی ہیں۔  
 (۱) آنکھ کی خارش۔  
 (۲) ناک سے پانی سا بہنا  
 (۳) خارش آنف۔  
 (۴) ناک کی کھجی، ناک کا رگڑنا  
 (۵) صلابت آنف۔  
 (۶) ناک کی سختی  
 (۷) علی الصبح ریش آنف بہت ہی نمایاں ہوتی ہے۔  
 (۸) ان علامتوں کی وجہ سے اس کو مختار نزلہ زکام خیال کر لیا جاتا ہے۔  
 (۹) خارش چشم۔  
 (۱۰) آنکھوں کی کھجی ہٹ بھی ہوتی ہو سکتی ہے۔

سریری امارات :-

(۱) ناک کی رنجہ زردی یا سبز اور متورم ہو جاتی ہے۔  
 (۲) ناک سے اخراج بہت صاف ہوتا ہے اور پتلا پانی جیسا ہونے لگتا ہے اور بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو پیپ دار سرایت زدہ ہو جاتا ہے  
 (۳) احمراز چشم۔  
 (۴) آنکھوں کی سرخی بھی واقع



ہو سکتی ہے ایسا خاص طور پر کبھی تپ کا ہی  
میں زیادہ ہوتا ہے۔

(۴) بعض افراد میں ناک میں سحرانے یعنی  
(گھٹلیاں) بھی پائی جاتی ہیں۔

(۵) حلق کے نوزتین (بادام حلق) بڑے  
بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان پر درم نہیں ہوتا۔

#### علاج

(۱) مخصوص تباہیر  
(۱) فوراً ماحول سے الرجین کا قلعہ قمع کرنا

چاہیے بال'ادن' پر وغیرہ مکان سے باہر  
کر دینے چاہئیں اور مکان خیار سے پاک کرنا

چاہیے  
(۲) ہوا صاف ستھری اور پرفضا ہونی

چاہیے۔  
(ج) ادویات :-

(۱) موسمی تپ کا ہی کے لئے انٹی ہسٹین  
ادویات مثلاً سٹروئین، کلیم، اسائنوین،

ہسٹین، تھیفورین براہ دہن مفید ہو سکتی ہیں  
(۲) ناک کی فشار خفاطی کو سکیرٹس کے

لئے ان سٹین پیلوین ایلیش ڈرا پر سے استعما  
کرنا چاہیئے۔

(۳) کھانسی کے لئے سیرپ ایفیڈرین  
فیو یا ربوٹن، قرغان کا مرکب دینے سے نکل

استعمال کرنا چاہیئے۔ شدید حالت میں نرسفرین  
۳ تا ۵ ملی گرام استعمال کی جاسکتی ہے  
(۴) بطور محرک وردن الف اور نیالین استعمال  
کی جاسکتی ہے

(۵) شدید تپ کا ہی میں کوئی مسون ایک  
نہایت سریع اثر دوا ہے لیکن نہایت لا

ہے یہ ہارمون معالجات میں پیش کی گئی ہے اور  
یادہ گھٹنے میں کامل سکون پہنچتی ہے عام طور

پر ہائڈرو کورٹی مسون یا کورٹیل پر شکل بھیج  
استعمال کی جاتی ہے۔

(۶) سیلان الف کو روکنے کے لئے انڈوین  
کام کرتی ہے۔ لیکن اس سے منہ کی خشکی بھارت

کی خرابی، دل کی دھڑکن، چہرے کی تھاپت پڑا  
ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے ٹیکچر سیلا ڈیٹا استعمال

کیا جاسکتا ہے

#### ۱۶۔ تپش شمس

Sun Stroke

#### تمازت آفتاب

Heat Stroke

یہ بھی حرارت برقرار رکھنے والی میکانیت  
کا شمل ہے جو زیادہ حرارت لگنے سے پیدا  
ہو جاتا ہے

جوارح (ہاتھ پیر وغیرہ) کی مالش کیجئے۔ ل  
(۳) آسکین الم (مسکن ادویات کے استعمال)

سے پرہیز کیجئے کیونکہ ایسا کرنے سے حرارت  
قائم رکھنے والی میکانیت میں خلل پڑ جاتا ہے

(۴) دوبارہ حرارت لگنے سے بچانے کیلئے  
حوئے ناک حرارت سے حساسیت پیدا ہو سکتی

(۵) ان تباہیر کے علاوہ انٹی ہسٹین ادویات  
مثلاً انکولان ٹیو براہ دہن استعمال کرائی۔

جاسکتی ہے چہرے کی تھاپت، پیش پیش  
کی علامات کو فروگردیتی ہے۔

#### ۱۷۔ ثوران جلد

Eruption

لیکایک جلد پر سرخی اور پھنسیوں کا نکل  
آنا ثوران جلد کہلاتا ہے۔ یہ سیرم کی بیماری کی

ایم علامت ہے جو نکلنے لگانے کے بعد نمود  
ہوتی ہے۔

علاج :- انٹی ہسٹین مرکب مثلاً سٹروئین  
کلیم براہ دہن مفید ہو سکتی ہے اور ایوں کی

بھیج بھی براہ دہن دی جاسکتی ہے۔  
۱۸۔ جذباتی متمنی

Motion Sickness

وہ بیماری جو کبھی قیم کے سفر میں پیدا ہوتا ہے مثلاً

سریری علامات (اور انمازات  
لیکایک بے ہوشی، بخار کی شدت، گرم

معتود (متماہٹ کے ساتھ) اور خشک جلد  
ہو جاتی ہے۔ بعض سرلیج، بے قاعدہ اور ضعیف

ہو جاتی ہے اور دکانا رلیپائنہ آنے لگتا ہے۔  
درد سر، دماغ سر، متنی اور بھارت کے

خلل بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔  
معتد کا درجہ حرارت ۱۰۰ تا ۱۰۱ اف ماگ

ہو پوچ جاتا ہے جسم کی آبی حالت اور ناک کا  
مافیہ طبعی حالات پر رہتا ہے۔

علاج :- ۱۔ علی درجہ حرارت کو کم کرکے  
نوجہ دینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔

(۱) مخصوص تبرک کوئی نہیں ہے  
(ج) عمومی تباہیر :-

(۱) مرلیش کو ٹھنڈے سایہ دار مقام پر  
رکھے اور بدن کے تمام کپڑے اتار دیجیئے منہ

پر پانی چھڑکنے کے بعد ٹیکھا اٹھلنا چاہیئے ٹھنڈی  
پانی میں آمیزن کرائیے یا برف کا گلدہ باز دیئے

درجہ حرارت کم کرنے کے لئے برف کے پانی کا  
حقنہ کیجئے لیکن جسم کا درجہ حرارت ۱۰۲-۱۰۳

کم نہ کیجئے جب درجہ حرارت اعتدال پر آجائے  
تو تمام دافع بخار تباہیر روک دیجیئے۔

(۲) دوران خون برقرار رکھنے کے لئے



سمندری مٹی، ریل گاڑی کی مٹی اور فضائی مٹی  
(ہوائی جہاز کی مٹی)

## علاج

(۱) مخصوص تدابیر:-

(۱) بحری جہاز، ہوائی جہاز کی مٹی کے لئے  
ڈراما مین ٹیلیٹ براہ دہن سوار ہونے سے قبل  
استعمال کر لینی چاہیئے۔  
(۲) بے سین ٹیلیٹ (ساختہ پارک  
ڈپوسٹ) ایک بہترین..... دوا ہے جو ہائپر سین  
ہائپر دوبرو مائیکل اور بنیا ڈیل کامرب ہے۔  
ڈاکٹرے سن گیل نے مندرجہ ذیل آمینو  
ہوائی مٹی کے حفظہ تقدم میں بہت ہی موثر  
بتلایا ہے۔

اسکو پلا سین پی ڈی "ایگرین

بنیا ڈیل "ایگرین

یہ ایک کیپ شول میں پھر کر مٹی آئے سو  
پگھلنے پہلے استعمال کرایا جائے لیکن یہ منہ  
کی خشکی اور اونگ پیدا کرتا ہے اور دل کے بعض  
کے لئے نقصان دہ ہے۔

جی۔ عمومی تدابیر:-

(۱) سیال غذا دیجئے اگر تے شدید ہو تو  
گھوکوز کامیال استعمال کیجئے۔ رکھئے  
(۲) سر پر ٹیکہ لگائیے اور آنکھ کھلی ہوئی

(۳) نفسیاتی بے چینی سے بچنے کے لئے جذبات  
کو قابو میں رکھئے۔

## ۱۹۔ جسمانی حساسیت

## Physical Allergy

یہ بھی ایک حساسیت ہے جو متعدد جسمانی  
حوال مثلاً روشنی، حرارت، برد، دوا، میکا  
خارش سے، یا کسی ایسی چیز کے لگنے سے واقع  
ہو جاتی ہے جو حساسیتی خلیں پیدا کرتی ہو۔

## علامات و امراض

جسم پر میکائی خارش سے پھر میں پھر بھی ہیں  
اور دبانے سے دم خود ا رہو سکتا ہے برد  
سے حساسیت میں شری اور عرونی جسمی اذیا  
خاص طور پر ظاہر ہو جاتا ہے آنسوؤں کی کثرت  
چھینکیں، کھانسی اور پی دہ بھی نمایاں ہوسکتا  
ہے سورج کی روشنی لگنے سے شمس شری یا اکثر  
جیسا جلدی نوران بڑھ سکتا ہے اور حرارت  
کی حساسیت سے خارش اور شری پیدا ہو سکتا  
ہے یہ نام علامات ثانوی درجہ رکھتی ہیں اور  
ان کو کسی بڑے مرض کی علامات ہی تصور کیا  
جاتا ہے۔

علاج:- علامات کو سکون دینے کے  
لئے صرف انٹی ہسٹامین ادویات مثلاً سائیکو

انٹی سان، ہسٹامین دہیرہ استعمال کی  
جا سکتی ہیں۔

(۱) روشنی سے حساسیت پکڑنے والے  
مریضوں میں جلد کی کپڑوں سے حفاظت، سیاہ  
دستار پہننا اور آتش جال کی اشیا مثلاً  
عطریات، آئین، یوگا موٹ وغیرہ سے بچنا مفید  
ہو سکتا ہے۔

(۲) سردی سے حساسیت رکھنے والے  
افراد کو گرم آب دہوا کا علاقہ پسند کرنا چاہیئے  
ٹھنڈے مشروبات، غذائیں اور خشوں سے پرہیز  
کرنا چاہیئے۔

(۳) دھرم کی علامات کو گرانی سے سکون  
دیا جا سکتا ہے یا کسرت کرائی جا سکتی ہے۔

(۴) گرمی سے حساسیت پکڑنے والے  
افراد کو بھی سرد آب دہوا میں رکھنا چاہیئے اور  
ٹائی ٹائیڈ و کیمین دھون دیر دی راہ سے مفید  
ہو سکتی ہے۔

## ۲۰۔ چنبل۔ صدفیہ

## Psoriasis

یہ بھی جلدی حساسیتی خلیں ہے جس کا  
سبب غیر معلوم ہے یہ کئی اقسام کا ہوتا ہے۔  
علامات و امراض:- جلد پر نوران

ہناہت سرخ ہوتا ہے۔ جلد پر یا ایک نوکلار  
سہائی دھبے پڑ جاتے ہیں اور یہ داغ سا نہیں  
پڑھتے ہی رہتے ہیں دھبے دور کرنے سے خون  
جاری ہو سکتا ہے اس کا نوران تمام جوارح،  
دھڑا در کھوپڑی پھیل جاتا ہے اور جسم پر جگہ  
واقع ہو سکتا ہے ناخن بھی متاثر ہو سکتے  
ہیں جلدی شدت میں فرق پڑ سکتا ہے کبھی یہ  
غائب ہو جاتا ہے اور کبھی پھر اُٹھتا ہے۔

علاج:- اس کا کوئی مخصوص علاج  
نہیں ہے صرف علامتی علاج ہی ہے اور  
کی مقامی حالت قابو میں کرنی چاہیئے۔

(۱) شدید درجہ میں عمومی علاج یعنی ملین  
جلد مرطوب ڈرلنگ کاتی ہوتا ہے کوئی لطیف  
مرع بھی لگا جا سکتا ہے

(۲) پرلے درجہ میں کرائی ساروین مرع  
میں پانچ فیصد بی سلیک ایسڈ شامل ہو لگا  
چاہیئے۔

(۳) انٹی ہسٹامین ادویات مثلاً ایل مرع  
لگانے سے فوری سکون مل سکتا ہے اور یہ کئی  
ایول ٹیکہ بھی دی جا سکتی ہے۔

(۴) بعض اوقات کرڈوٹا درم بہت ہی  
موثر ثابت ہوتا ہے۔

(۵) وٹامن ڈی کی خاصی پورا کرنے کے لئے وٹامن

ڈی زیادہ مقدار میں استعمال کرنی چاہیے، لیکن ایک لاکھ تا ۲ لاکھ یونٹ روزانہ

### ۳۱۔ حس زدگی

#### Sensivity

یہ ایک اصطلاح ہے جو حساسیت اور استہداف کے درمیان تعلق رکھتی ہے۔ دیکھیے حساسیت، الرجی، انٹی جن انٹی باڈی وغیرہ۔

### ۳۲۔ حساسیت

#### Allergy

اس کے خاص ظواہر تپ کا ہی، دم، اعضائے ہضم کے خلل، شری، عروقی عصبی اثر اور سیرم کی بیماری، درد شقیقہ وغیرہ ہیں اس کے اسباب حسب ذیل ہیں۔  
(۱) گھاس بھوس یا پولنر  
(۲) لٹخ جات  
(۳) غذا میں مثلاً آٹا، دودھ، چھلی، چو، گوشت،  
(۴) ادویات :- مثلاً اسپرین، سلفا، آدیا  
انٹی ہسٹا مین۔  
(۵) جراثیم مثلاً، فطریات، جراثیم، فطریات

درنے۔  
(۶) کیمیاوی اشیا، مثلاً ربڑ، رنگ، چمڑہ، آرائش جال اشیا، زیورات وغیرہ  
(۷) جسمانی عوامل مثلاً، گرمی، سردی، روشنی اور دباؤ  
(۸) دیگر عوامل :- ذہنی حساسیت، ذہن سیرم وغیرہ  
علاج :- (۱) پروسیجر حساس اشیا سے  
(۲) عدم حساسیت حاصل کرنا  
(۳) انٹی ہسٹا مین ادویات  
(۴) علامیاتی علاج  
(۵) عمومی تدابیر  
(دیکھیے حسب موقعہ مذکورہ امور)

### ۳۳۔ حساسیتی التهاب فم

#### Allergic Stomatitis

شوزش دہن :- یہ بھی ایک حساسیتی مصل ہے جو کثرت ہی اسباب اور متعدد امراض کے اقسام کے امراض میں واقع ہو سکتا ہے اس کی اہم علامات درد لہاب دہن اور گندگی تفس ہے۔  
علاج :- انٹی ہسٹا مین ادویات سے  
التهاب دہن کا علاج یہ ہے کہ کوئی انٹی ہسٹا مین

### ۳۴۔ حساسیتی دم

#### Allergic Asthma

یہ اعضا تنفس کا ایک حساسیتی مصل ہے جس میں شہی عضلاتی نظام کا تھخ، خفا، رنجائی کا اثر غلیظ، چکدار بلغم کی پیداوار ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر تھخ بہر کے دورے پڑنے لگتے ہیں اور سانس لینے میں بڑی دقت ہونے لگتی ہے اور عام طور پر تسدد کے ساتھ سینہ بھونے لگتا ہے جس کو فٹاخ الصدر کہتے ہیں۔  
بچوں میں یہ دم مردہ منظم اور آراکیزا کے رتقا ہوتا ہے۔

بحث اسباب :- یہ دم بھی طوی پر انداز، گندم اور دودھ کھانے سے بہت جلد لگتا کھرا ہوتا ہے، لٹخوں، اسرابت، یا جسمانی یا دیگر امور سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔

بچوں میں دم کا سب سے عام مصلب صحن اشیا کا سونچ لینا ہے خصوصاً گرد غبار پر ردی، ادن، ادکا پاک وغیرہ یہ تمام چیزیں کوڑا کرکٹ، خاک، دھول، بلی اور کتوں اور چڑیوں کی غلاظت سے لگ جاتی ہیں  
سریری کا شفا  
(۱) علامات :- دم کی مندرجہ ذیل عام علامات نمودار ہوتی ہیں۔

دوا براہ دہن استعمال کی جائے اور دہن کی خاص طور پر صفائی کی جائے، اور جنتین وائلٹ ایک فی صری کا سولوشن دن میں دو بار منہ کے اضرار پر لگایا جائے

### ۳۵۔ حساسیتی التهاب ملتحمہ چشم

#### Allergic Conjunctivitis

یہ بھی ایک حساسیتی مصل ہے جو تپ کا ہی کی ایک اہم علامت ہے یہ غذائی حساسیت، ادویات کی حساسیت اور دیگر حساسیتوں سے نمودار ہو سکتا ہے۔ اہم علامت خراش چشم ہے۔  
علاج :- دیکھیے التهاب ملتحمہ چشم  
ادریالین سولوشن اور انٹین پریون  
سولوشن آنکھ میں ٹپکانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے اور براہ دہن ہسٹا مین کی بھیج دی جاسکتی ہے

### ۳۶۔ حساسیتی درد سر

#### Allergic Headache

یہ بھی ایک حساسیتی مصل ہے جو حساسیت کے دوران میں نمودار ہوتا ہے یہ درد سر اچانک اور حساسیتی عوارض میں عام ہوتا ہے۔  
علاج :- کوئی انٹی ہسٹا مین دوا براہ دہن اس کے حملے کو روک سکتی ہے۔



ہونی چاہیے۔  
(۳) دافع تشخ شعبہ ادویات کا استعمال مفید ہوتا ہے۔

اڈرنالین سب سے پہلے اسی کو آزمانا چاہیے یہ اگر تا ۲ سی سی کی مقدار میں سخت جانگی راہ سے انجکٹ کیجاتی ہے اور بہت ہی مؤثر اور سکون بخش دوا ہے۔

اگر اس کا طویل اثر مطلوب ہو تو اڈرنالین ان آئیل گا کوئی مرکب اگر تا ۲ سی سی کی مقدار میں درون عضلاتی راہ سے انجکٹ کرنا چاہیے صحت کے رشتاش کے لئے ادویات

یہ ادویات ایک نیپولائزر کے ذریعہ حلق میں لگائی جاتی ہیں جس سے تشخ کو سکون ملتا ہے۔

(۱) اڈرنالین سولوشن ۱۰۰ میل ایک حصہ کا محلول درون عضلاتی راہ سے یا ایک فاس شیشے نیپولائزر کے ذریعہ استعمال کرنا چاہیے

(۲) لوری سوڈرین داباٹ لیپورٹیرین

(۳) آتسو پرل

(۴) دیونفرین

شدید اور لمبہ حلقوں کے لئے ہائپر ٹونک

گلوکوکورٹیسولوشن درون وریدی راہ سے ۱۰

تا ۲ سی سی کی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اگر اڈرنالین کا استعمال ناکام ہو جائے تو

(۱) ایک ایک حملہ جو کسی قدر کھانسی ریزش (چھینک) ناک کاغیر ادوا متلا کے تشخ ہوتا

(۲) شدید حملہ کا آغاز جوعضوات نفس کی

پے چینی کھانسی اور ناک کی خوراک ہٹ

نفس کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے

(۳) شدید ترین حملہ جس میں مریض ہنرابت

یہ چین ہو جاتا ہے اور سانس کی آمدورفت

میں دقت محسوس کرتا ہے اور چہرہ ہنرابت

فٹ پڑ جاتا ہے اور کبودی ہو جاتا ہے

ب۔ امارات (نشانیوں)

(۱) سینہ پھول جاتا ہے اور سانس لمبا ہو جاتا

(۲) کھانسی نمایاں ہو جاتی ہے۔

(۳) سینہ ٹھنکے سے بہت آواز دار معلوم

ہوتا ہے

(۴) مسامع الصدر سینہ پر دگتے سے سانس

کی آمدورفت معلوم ہوتی ہے اور نفاذ

و آواز نفاذات سے پر معلوم ہوتی ہے۔

علاج :- (۱) جھومی علاج کے لئے

دیکھئے حساسیت کا علاج۔

ب۔ شدید حملہ کا علاج

(۱) جہاں تک ممکن ہو سکے الرحمن سے آنا د

کمرے میں لیٹر پر آرام کرنا ضروری ہے

(۲) کمرے کی برودت و آب و ہوا اعلیٰ

امینو فامین درون وریدی راہ سے گلوکوکوز کے

ہمراہ استعمال کرنی چاہیے یا مقعد کی راہ سے

امینو فامین سپوزیٹری استعمال کرنی چاہیے۔

ج۔ دمہ کا معمولی حملہ اور کم کھانسی کے سکون

کے لئے :-

(۱) ایفیڈرین امینو فامین فینو باربٹون مرکب

ایفیڈرین ہائڈروکلورائیڈ ۲ گریں

امینو فامین ۲ گریں

فینو باربٹون ۲ گریں

یہ کسی کھانسی کے شربت کے ہمراہ دیا

جاسکتا ہے۔ دمہ کا حملہ فوراً سکون کر دیتا ہے

۲۔ منفش بلغم ادویات

یہ دمہ میں چیکدار بلغم کو خارج کرنے اور

ان کو نرم کرنے کے لئے استعمال کیجاتی ہیں مثلاً

(۱) پوٹاسیم آیوڈائیڈ اگرین

پانی قطرہ

یہ ۱۵ تا ۲۵ قطرے بہ ہمراہ دودھ یا پھل

کا رس روزانہ ۳ بار دیا جاسکتا ہے بڑے آدمی

کے لئے ۱۵ تا ۲۵ قطرے دیا جاسکتا ہے۔

(ب) سیرپ آف اپے کاک پوائس پی

(شریت عروق الذہب)

یہ دمہ کے شدید حملہ میں یا طویل دمہ میں

بطور قے آور مفید ہو سکتا ہے وائٹم اے کاک

بہ ہمراہ پانی یا شربت بھی استعمال کیا جاسکتا

ہے اگر کھانسی معتاد سے فائدہ نہ ہو تو مکرر دیا جاسکتا

بچوں کے لئے ۵ تا ۱۰ سی سی اور بڑوں کے لئے ۱۰

تا ۲۰ سی سی کی مقدار میں دینا چاہیے۔

(ج) کوڈی کوڈرین ہائڈروکلورائیڈ ۱۰ گریں

بھی دمہ میں تجویز کی جاسکتی ہے یہ ایک جلدوجاؤ

اثر گراں قدر دوا ہے

(۳) دمہ میں مسکن جذبات ادویات

اگرچہ ان کے بارے میں کوئی طے شدہ امر

نہیں ہے البتہ میٹاڈرل یا فینو باربٹون تجویز

کیا جاسکتا ہے۔ معاہدہ کی راہ سے شدید

کے حملوں میں کلورل ہائڈریرٹ تجویز کی جاسکتی

ہے اس کا حقہ بطور مسکن مفید ہے۔ لیکن نیشن

استعمال نہ کیجئے۔

(د) عبوری تدابیر

(۱) انٹی ہسٹائین ادویات :-

یہ ادویات دمہ کے حملوں سے بچانے کے لئے

دن میں ۲ یا چار بار تجویز کی جاسکتی ہیں امداد

کا استعمال شری اور تپ کا ہی میں استعمال

کی یہ نسبت کمزور ہے اور شاذ و نادر ہی کامیاب

ہوتی ہے۔ عام طور پر سیرپ میٹاڈرل سیرپ

فننے ڈل فرکان الکوز اور دیگر انٹی ہسٹائین

ادویات استعمال کیجاتی ہیں جن سے شیعہ کا

[illegible]

۳۷۔ حاشیہ غفل

### Allergic Disorders

حاصلی علیہ علامات تو ظہورِ مہمانِ اعظمی

[illegible]

۱۰۰۰ روپے  
 ۱۰۰۰ روپے  
 ۱۰۰۰ روپے  
 ۱۰۰۰ روپے

[illegible]

۴۸ - خراش جلد

Figure 1

ہم ایک سو پانچ سو چوبیس ہزار  
ایک سو تین سو نو سو نو

اور کمر ہوا تو چاہیہ خراش بہت سے انتہا  
سے پیدا ہو سکتی ہے اور بہت سے جلدی امراض  
کی علامت ہے۔

درمانی خواص صحت اشرفی اور غیر معنی  
التراب جلد رنگ بارنا اور کافرا اور قحطان  
بالہ کی خراش کے لئے دیکھئے مستحق عنوان

علاج :- اسباب کا دور کرنا مستحق قوی  
اور خوراک لامہانی علاج پر توجہ دیکھئے اور جوشی  
خراش بالکاح کر دو کر کے لئے اٹھی ہو سکتی  
معالجہ اختیار کیجئے۔

دوسرا باب :- جلد بالکاح جلدی اشرفی اور کرام کی مقدار  
میں ایک برائیت گزیر الاستعمال دوا ہے  
جو خراش میں دہنی کے لئے بہت مفید  
اور مقامی استعمال کے لئے بہت سی ادویات  
اور اشرفی مہشامان اشرفی امراض اور کرم وغیرہ  
و استقبالیہ ہوتی ہیں لیکن مقامی خراش کے  
لئے مفید ترین اور بہت وسیع الاستعمال  
مستعمل ایک حصہ  
سمیر ایک حصہ  
قندیل ایک حصہ

یہ ادبیات کسی دسینین یا عرب میں ملنا  
جلد پر لگائی جاسکتی ہیں  
ہر قسم کی خرافہ جلد (کمپاٹ) جبرج



(۲) درون افزائی خصل

(۳) نفسیاتی خصل

علاج :- اگر کسی سہلرت مثلاً سوزناک، جراثیم تناسل اور دیگر جراثیمی امراض کے سبب ہو تو ان کا اسٹی بولنگ اور ادویات مثلاً پین سیلین مریم، سلفا کرکات کے مریم سے علاج کیجئے۔ اگر درون افزائی خصل کے سبب خراش فرج ہے تو ہارمون کے مرکبات مثلاً اسٹیلن لکٹو مریم اور پیرٹنلن مریم استعمال کیجئے۔

اگر نفسیاتی امور کے سبب خراش فرج ہے تو علاج بالنفس (سائیکو پیئرانی) تداویر کو بروئے کار لائیے۔ اور فینو ہارمون پلگورین براہ دہن دے کر تسکین جذبات پیدا کیجئے۔ اگر حساسیتی رد عمل یا خصل کے سبب خراش فرج یا مقعد ہے تو کوئی انٹی ہسٹا مین مریم مثلاً ہسٹا مین، سائوٹین مریم استعمال کیجئے اور شدید حالات میں ہائیڈرو کورتھون مریم لگائے۔

۳۔ دم

Asthma

دیکھئے حساسیتی دم اور شعبی دم

بچہ

اور کھلی) کے لئے بولڈکس مریم ساختہ گی ایکسپیر دو ہے جو ہر آسانی استعمال کیجا سکتی ہے اور براہ دہن سنڈو سٹین کیلیم دی جا سکتی ہے (۵) بچوں کی خراش جلد اور پاکیزگی کے لئے مندرجہ ذیل پوڈر بہت مفید ہے۔

میکلنٹیم کاربوئیٹ ۴ حصے  
پورک الیڈ ۴ حصے  
ٹائلک پوڈر ۳ حصے

ان تینوں کو باہم ملا کر ایک ڈبلے میں بند کر کے رکھ لیا جائے اور بچہ کی نازک جلد پر چھڑکا جائے۔

(۶) متعدد شدید جلدی امراض کی خراش جلد کے لئے کورٹی سون آکٹھنٹ استعمال کیا جاتا ہے جو دافع حساسیت دافع لہتا جلد ہے اور نہایت گراں ہے

۲۹۔ خراش فرج و مقعد

Pruritus Ani, et vulvae

یہ بھی ایک حساسیتی خصل ہے جو مقعد میں کھلی پیدا کرتا ہے اور عورتوں کے بیرونی اعضا تناسل میں خراش پیدا کرتا ہے اس کے متعدد اسباب ہیں مثلاً (۱) سہلرت

۳۔ ڈنک مارنا کاٹنا

Bites

پتو کاٹنا، اچھر کاٹنا اور مہال کی کچی کاٹنا، میٹر، متیا کاٹنا، یہ سب خراش جلد پیدا کرتے ہیں اور یہ بھی ایک حساسیتی خصل ہوتا ہے۔ علامات :- مقام داؤد شدید درد ہو جاتا ہے۔ خوب کھانچ اٹھتی ہے اور سرخی کا گھیرا سا بن جاتا ہے۔

تمام حجم پرشری کا قودان پھیل جاتا ہے اور بار بار ایک پھینیاں سی می ٹیکل آتی ہیں اس عمومی جسمانی رد عمل سے بخار سا بھی ہو جاتا ہے کالے کے مقام پر شدید درد ہو جاتا ہے علاج :- بعض شدید حالات میں طبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے

(۱) شدید مقامی رد عمل دور کرنے کے لئے خصوصاً مہال کی کچی کے کالے میں سو دور کرنے کے لئے کوئی مخدر انٹی ہسٹا مین مریم لگانا چاہیے عام طور پر پیرکین مریم اور سائوٹین مریم کا مشترکہ استعمال کیا جاتا ہے موثر ثابت ہوتا ہے اور براہ دہن سنڈو کیلیم دی جا سکتی ہے

(۲) نظام جسمانی کے رد عمل کو قابو میں لانے کے لئے فوراً انٹی ہسٹا مین ادویات

براہ دہن دینی چاہئیں۔ امداد دینا لین تحت جلدی راہ سے انجکٹ کرنی چاہیے یا شدید حالت میں ہائیڈرو کورتھون درون دہنی راہ سے انجکٹ کر دینی چاہیے۔ یہ مہال کی کچی کے کالے کے لئے ایک محفوظ زندگی دوا ہے ہائیڈرو کورتھون کا مریم بھی ماؤف حصے پر لگایا جا سکتا ہے۔

مابعد حفاظت :- جب مریض کی شدید علامات رختے ہو جائیں تو براہ دہن دینا منی مثلاً نیرواٹلٹ کا استعمال زیادہ مقدار پر مفید ہو سکتا ہے اور بطور حفظہ اقدام فلیا انٹی استعمال کرنی چاہیے۔

۳۳۔ زکام عام

Common Cold

شدید التهاب الف

Acute Rhinitis

یہ بالائے اھنا رتھس کی غیر جراثیمی سرآ ہے جو عام طور پر عورتوں، مردوں اور بچوں میں نمودار ہو جاتی ہے اس کے تین اہم اسباب (۱) متعدد اقسام کے قتب (۲) تادی جراثیمی سرائٹس (۳) حساسیتی رد عمل

(۴) نفیاتی امود

سریری کاشتات :-

(۱) علامات :-

کسل مندی، چھینکنا اور سرگی گزانی

(بجاری پن)

(۲) امارات :-

مٹھی اخراج الف (آب خون جبیناں)

سے بلغم خارج ہونا، حرطوب ناک سے رخیٹ

جانا عام طور پر بجا رقیف ہوتا ہے لیکن بچوں

میں نہایت اعلیٰ ہو سکتا ہے

(۳) لیپو بیٹری کاشتات میں خون کے سفید

ذرات طبعی حالت میں رہتے ہیں۔

علاج :- (۱) عمومی تدابیر :-

(۱) عام جگہ کی کسل مندی و بخار دور

کرنے کے لئے مندرجہ ذیل نسخہ بہت ہی موثر ہے

السیرین ۵ گریں

دٹامن سی ۵۰ ملی گرام

یہ دونوں باہم ملا کر پیر کی شکل میں

دن میں ۳ بار دی جائے دٹامن سی دسلین

ریڈ وکسان (دوچی) بہت عمدہ استعمال کرتی

چاہیے یہ آمیزہ بخار کسل مندی اور سرایت

کو دور کرتا ہے اور فوراً زکام میں بحالی پیدا کرتا

مزید برآں حساسیت اور الم کو دور

کرنے کے لئے کوری سیڈین ٹیبلٹ (روزانہ

دو بار بہت ہی موثر ہے۔ رات کو ڈوس پوڑ

۵ گریں بہ ہمراہ پانی دیا جاسکتا ہے یہ زکام کے

مریضوں کو سکون دیتی ہے

(۲) زکام میں سیال خصوصاً لطیف مشرو

اشیا کا اضافہ مفید ہوتا ہے۔

(۳) زیادہ کام کرنے سے پرہیز کرنا اور

زیادہ آرام کرنا مفید ہوتا ہے۔

(ج) مقامی تدابیر :-

(۱) سیرپ آف الیفیڈرین یا کاسٹورین

محکم الف دبا ہے یہ کھانسی کو سکون دیتی

ہے اور بطور منقش بلغم استعمال کی جاتی ہے

تلفیڑول کف سیرپ اس مقصد کے لئے بہت

مفید ہے۔

(۲) انٹی ہٹسین ادویات اور سیرپ کو

کامرب فتنے ڈل ساختہ سے آمیز کر کے یا فزکال

کف سیرپ کھانسی کو سکون دینے کے لئے استھا

کیا جاسکتا ہے۔

(۳) ناک کے تسد (مٹساؤ) کو کم کرنے

کے لئے نیوسلفن ۲۵ فیصدی اور ناول

سیلائن میں حل کر کے ایک تالم قطرے ناک

میں ڈرا کر سے ڈالا جاسکتا ہے یا ان کی

ڈرا پر سے استعمال کیا جاسکتا ہے یا نیز

ڈرا پر سے استعمال کیا جاسکتا ہے یا نیز

نسخہ استعمال کیا جاسکتا ہے

(۴) ناک کا عددی انقباض کم کرنے کے لئے

مندرجہ ذیل سادہ نسخہ بھی بہت مفید ہے

الیفیڈرین ہائیڈروکلورائیڈ ۲۵ ملی گرام

سیکونال (ملی) ۱۵ ملی گرام

ان دونوں کو ملا کر کسی کیپ شول میں ڈل

کر دیا جائے ایک کیپ شول ہر چھٹے

گھنٹے دیا جاسکتا ہے یہ سب سے

بہترین محرک مسکن آمیزہ ہے۔

(۵) خراش حلق کے لئے گلوکوز ۱۰ فیصدی

کا نارمل سیلائن میں حل کر کے محلول

سے غرغہ کیا جاسکتا ہے اگر سرایت

بہت زیادہ ہو تو بینی سلین لوز بنجر

منہ میں رکھ کر چوسا جاسکتی ہے۔

(۶) ایک ڈاکٹر کا بیان ہے کہ زکام کے ابتدائی

درجہ میں مندرجہ ذیل نسخہ عام طور پر

مفید ثابت ہوتا ہے۔

کوڈین سلفیٹ ۱/۲ گریں

پاپا ویرین ہائیڈروکلورائیڈ ۱/۲ گریں

اگرچہ یہ تارک نمک دوا ہے لیکن جھبی

زکام کی علامتوں کو قابو میں کر لیتی ہے

یہ کھانسی کو دباتی اور نیند لاتی ہے

جھبی بے چینی کو سکون دیتی ہے۔

(۷) خشک اور تکلیف دہ کھانسی کے لئے

کلورائیڈ کا کچھ بہت مفید ہے۔

المونیم کلورائیڈ ۵ گرام

سیرپ اپے کاک ۱۵ سی سی

سیرپ گلاسٹریٹ ۴۰ سی سی

اس میں سے ایک چار کا چھ بھر ہر دو

گھنٹے دیجئے۔

(۸) جوں ہی زکام کی ابتدائی علامات نمودار

ہوں ان کا مقابلہ کرنے کے لئے کلورٹرائی

میتین یا فیتورین بہ ہمراہ دٹامن سی

(ریڈ وکسان) استعمال کرنا بہت ہی مفید

ہے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشہور یونانی

حکیم کلفوشس نے کہا ہے کہ ”زکام سولہ

چھینکے کے اور کچھ نہیں ہے“

## ۳۳۔ سیرم کی بیماری

## Serum Sickness

یہ ایک جسمانی رد عمل ہے جو ہر ونی سیرم کے انجکشن

لگانے سے واقع ہو جاتا ہے یہ حساس اور غیر

حاصل افراد دونوں میں نمودار ہو سکتا ہے رد عمل

کی شدت کا مدار سیرم کی پاکیزگی و تنازگی پر

ہوتا ہے اور غلط طریقہ استعمال اور غلط حیوانی

سیرم سے بھی ایسا رد عمل پیدا ہو سکتا ہے۔



بروزنی مفصل (سیرم) کا انجکشن انٹی باڈز (ضد اجسام) کی پیدائش کو بڑھا دیتا ہے اور یہ ضد اجسام بقیہ انٹی جن سیرم کے ساتھ مل کر مزید حساسیتی رد عمل پیدا کر دیتے ہیں۔

سرسری کا شفاقت :-

سیرم کا انجکشن لگانے کے ایک ہفتہ بعد رد عمل کا حملہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے بشرطیکہ سالیقہ صاف موجود ہو۔ پوسٹی ڈفلیا قلعی ممیز ہوتا ہے۔

(۱) سب سے عام علامت جلد کا شری نما ٹوران ہے ٹوران کی دیگر اقسام (احمرار جلد) چمک کے سے داغ یا سرخ بخار کے نشانات بھی واقع ہو سکتی ہیں لیکن یہ کم عام ہیں۔

(۲) عروقی حصی اذیمائی کھجی ہٹ المی عذ کا مرض کلائی ظال (تلی کا بڑھنا، بخا کسل مندی اور درد) دم اور جوڑوں کی سرنخی وغیرہ لیکن یہ زیادہ عام نہیں ہیں (۳) حصی چید گیان۔ یہ شدید حالات میں موجود ہو سکتی ہیں

(۴) مہلک رد عمل جو استہدائی ضد سہائین کے مشابہ ہوتے ہیں عام طور پر سیرم کی غیر مقامی حساسیت میں ہی واقع ہوتے ہیں

رفقار مرض اور اتلا :-

سیرم کی بیماری خود ایک محدود مرض

ہے اور عام طور پر اسے ۷ دن تک رہتا ہے ممکن ہے کئی مہینے تک مرکزی نظام حصی کو نقصان پہونچتا رہے۔

علاج :- (۱) شدید علامتوں کو دفع کرنے کے لئے فوراً ڈرینالین کا تحت جلدی انجکشن لگائیے۔

(۲) معمولی اور متوسط درجہ کی علامتوں کو قابو میں کرنے کے لئے الفیڈرین استعمال کیجیے

(۳) مقامی طور پر رد عمل کو سکون دینے کے لئے سوڈیم بائیکاربونیٹ ۵ فیصدی کا آبی محلول کی سر دچی باندھئے۔

(۴) شدید حالات کے لئے کورٹی سون مریم یا کورٹی سون پرشکل صحیح براہ دہن استعمال کیجئے۔

(۵) آسجکل حساس افراد کو سیرم کے وقت انٹی سہائین ادویات استعمال کرانا ایک دستور ہو گیا ہے اس مقصد کے لئے کورٹی سون اور انٹی سہائین کا کوئی مرکب استعمال کیا جاسکتا ہے۔

استہدائی صدمہ اور موت :-

بعض اوقات گھوٹے کا سیرم استعمال کرنے سے ایک اہم رد عمل نمودار ہوتا ہے جو استہدائی کہلاتا ہے کسی غیر شفاف سیرم کا انجکشن لگانے کے

ترغذائی حساسیت (خصوصاً نیش پھلی سیرم) جو کلیٹ انڈس (اور دودھ) سے پیدا ہوتا ہے بعض افراد میں نفسیاتی عوامل بھی اس کو پیدا کرنے میں اہم حصہ لیتے ہیں مندرجہ ذیل اشیاء بھی اس کو پیدا کرنے کا ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔

ادویات :- سیرم سیرم کے انجکشن دیکھیں یا جسمانی عوامل کے انجکشن وغیرہ۔

سرسری کا شفاقت :-

شری کا شدید حملہ جلد جلد سے لیکر چند ایک ہفتوں تک محدود رہتا ہے لیکن دروازہ عود کرنے کا رجحان رہتا ہے۔

(۱) شری (بچی اچھلنا)

اس کے اعراض سرخ، رنگدار اور معمولی اجزاء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ گردش رد عمل ایک نمایا علامت ہے بڑے بڑے گھول پکتے تمام جسم کو نافذ کر دیتے ہیں۔ عام طور پر جسمانی کھجی نمایا ہوتی ہے اور جلد پر ہزر پیدا ہونے سے پہلے ہی ٹوڑا ہو جاتی ہے

(حب) عروقی حصی اذیمائی ایک زبردست بچی اچھلنا کی علامت ہے جو حلق پر یا زبان پر یا چہرے پر ہنایت عام ہوتی ہے۔ جلد کا ہزر ہنایت شدید ہوتا ہے لیکن خراش نہیں ہوتی شدید حالات میں حلقوم کا اذیمائی حلق کی

بدرستی جسم سے نکالتے ہی مقامی خراش شروع ہو جاتی ہے اور پھر فوراً عام جسم میں پھیلتی آتی ہے جس کے ساتھ حصی تکس خوب آتی ہیں۔ کھانسی دم اور تشویش ہو جاتی ہے مزین ایک صدمہ کی حالت میں ہو جاتا ہے دورے پر کموت دس منٹ میں ہی واقع ہو سکتی ہے اگر لہجہ بچ جاتا ہے تو عام سیرم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کا علاج اوپر مذکور ہے۔

خراش و کھانک کے لئے مسندو میں کھجی مفید دوا ہے اور وٹامن سی بھی مفید ہو سکتی ہے درد اور خراش کے لئے پروکین مفید ہے۔

### ۳۴۔ سفری متلی

Travel Sickness

دیکھیے جذباتی متلی

### ۳۵۔ شری۔ بچی اچھلنا

Urticaria

### عروقی حصی اذیمیا

Angioneurotic Oedema

Hives

داع القفیر

یہ ایک شدید یا خرم التہائی جلدی رد عمل ہے جو شایع حساسیتی قسم کا ہوتا ہے یہ زیادہ

بہت زیادہ سوجن، اعضا رتخس کو مسدود کر دیتی ہے اور بعد ازاں فوراً دم گھٹ کر موت واقع ہو جاتی ہے۔

### علاج

(۱) اگر کسی دوا یا غذا کے خوب نوش یا کھانے سے شری پیدا ہو گئی ہے تو فوراً ٹکلیں درست آور دوا دینی چاہیئے اور حقہ لگانا چاہیئے۔

(ب) فوراً کوئی انٹی ہسٹامین دوا براہ کین استعمال کیئے۔ سنڈو سٹین کلیم براہ دہن اس مقصد کے لئے بہت مفید ہے (ج) اگر حلقوم کا اذیتا شدید ہے تو فوراً ہی اور تیلین سبوشن ہزار میں ایک حقہ کا محلول تحت جلدی راہ سے اٹھاتا ہمنم کی مقدار میں انجکٹ کرنا چاہیئے اگر ضرورت پڑے تو اس کا سہرہ منٹ بعد انجکشن لگائیئے۔

(د) الفیڈرین ہائیڈروکلورائیڈ ٹپا اگرین کی مقدار میں براہ دہن دیجیئے۔

(ی) شدید اور خطرناک عروقی عصبی اذیمیا درگوں اعصاب کے درم شدید، یہ فوراً کوئی سون کا انجکشن لگائیئے۔ یہ بھی بجائی پیدا کر دے گی۔

(ف) فرمن شری (پرائی پی) میں خود زاد حوقی علاج (اڈو ہیمو ٹھیراپی) یعنی کی درید میں سے ۲۰ سی سی خون نکال لینا اور اس کو کچھ ڈھٹری کے صفایہ میں انجکٹ کر دینا مفید ہوتا ہے۔

اک، بعض مریضوں میں کھارے ٹراپیڈاکٹر کیٹ کم سے کم مقدار میں استعمال کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔

دافع درد سر ادویات اور مسکن ادویات اور منوم ادویات سے پرہیز کرنا مفید ہے اور دافع خارش لوشن اور پوڈرا استعمال کرنا مفید ہو سکتا ہے کوئی انٹی ہسٹامین کریم مثلاً ہسٹامین کریم یا سائونین وغیرہ جلد پر لگانا مفید ہو سکتا ہے۔

### ۳۴۔ شعبی دہم

BRONCHIAL ASTHMA

دیکھئے حساسیتی دہم

### ۳۵۔ عروقی عصبی اذیمیا

Angioneurotic Oedema

(دیکھئے شری)

### ۳۸۔ فالج لرزاں

Paralysis Agitans

### رعش

Parkinsonism

یہ مرکزی نظام عصبی کا ایک فرمن خصل ہے جس میں اعصاب کی حرکت سست پڑ جاتی ہے۔ کمزوری، عضلاتی سنجی اور لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ متعدد اسباب سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی بہت سی علامات ہیں لیکن بعض اطباء کا خیال ہے کہ یہ بھی دافع حساسیت معا لوج سے متاثر ہوتا ہے۔

### ۳۹۔ ہسٹامین درد سر

HISTAMINE HEADACHE

(دیکھئے حساسیتی درد سر)

### ۴۰۔ ہسٹامین صر

HISTAMINE SHOCK

— (دیکھئے استہداف) —

حکیم علی ضیاء احمد



## اشاریہ امراض

Therapeutic Index

نوٹ:- ذیل میں دافع حساسیت علاج کے زیر بحث امراض، عوارض و حوادث و حالات کے نام درج کئے جاتے ہیں اور وہ صفحہ بھی دیا گیا ہے جس پر کسی مرض کا نام ہے۔ امید ہے قارئین کرام کے لئے بہت مفید ثابت ہوگا۔

نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ
آئینہ کے حساسیتی امراض	۳۳	التهاب جلد غیر مقامی	۶۲
ابتدائی حسرت	۳۶	التهاب شعریہ بہرہ دم	۳۱
ادویاتی التهاب جلد	۶۱	التهاب ملحمہ چشم حساسیتی	۶۶
اذیما	۶۱	ب	
ادویات سے رد عمل	۵۸	بخار دوا	۶۵
اسہلانات	۵۸	بندش حیف	۲۵
اعضاء تنفس کی حساسیت	۵۹	بھڑکا کاٹنا	۱۸
اعضاء ہضم کی حساسیت	۵۹	ت	
اعضاء بول کی حساسیت	۶۰	تپ کاہی	۶۵
اکڑیا سے تواس جلد	۳۱	تپش شمس	۶۶
التهاب بجز	۲۳	تشیعی بیماری	۳۰
التهاب الف حساسیتی	۶۱	تشیع شعبہ	۲۳
التهاب الف عرونی	۶۲	تمازت آفتاب	۶۶
التهاب جلد تماس	۶۲	ث	
		ثوران جلد	۶۶

نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ
جذباتی متنی	۶۶	د	
جسمانی حساسیت	۶۸	درد	۱۸
ج		درد شقیقہ	۱۹
چنبل	۶۹	درد حیف	۲۵
ح		دمہ	۶۶
حس زدگی	۶۰	ڈنک مارنا	۶۶
حرق نادر	۱۸	س	
حاملہ کا مرض جلد	۳۳	ریڈی ایش بیماری	۳۰
حاملہ کی متنی	۶۰	رعشہ	۳۶
حمل کا لسم	۳۱	ن	
حساسیتی دار الجلد	۳۱	زکام عام	۶۶
حساسیت	۶۰	زہر بلا ثوران جلد	۳۲
حساسیتی التهاب فم	۶۰	ن	
حساسیتی التهاب ملحمہ چشم	۶۱	سمدری متنی	۳۱
حساسیتی درد سر	۶۱	سفری متنی	۸۱
حساسیتی دمہ	۶۱	سرخ جلد	۲۶
حساسیتی خلل	۶۶	سیرم کا ثوران جلد	۲۵
خ		سیرم کی بیماری	۶۹
خراش جلد	۶۵	ستیلہ	۳۳
خراش فرج دمقعد	۶۶	سوزش دہن	۳۰

## اسرارہ ادویات

## DRUG INDEX

ذیل میں اردو حروف تہجی کے لحاظ سے ادویات کی ایک مختصر فہرست موجود کتابچہ کی ہے  
ہے انگریزی ادویات کا انڈیکس کتاب کے ساتھ منسلک ہے امید ہے قارئین کرام  
کے لئے بہت مفید ہوگا۔

صفحہ	نام دوا	صفحہ	نام دوا
۲۳	بیتا ڈرل	۱۸	انتھی سان سولوشن فار انجکشن
۲۷	بیتا ڈرل سیرپ	۱۸	انتھی سان کریم
۵۱	بیتا سین	۱۷	انتھی سان ٹبلٹس
	پ	۱۷	انتھی سان انکڑ
۱۹	پروسیٹا زین	۱۷	انتھی سان سولوشن
۲۲	پیرازل	۱۸	انتھی کال
۲۲	پائری نیرازین	۲۵	ان ٹیلین
۲۲	پی بی ریٹ	۲۶	ان ٹیلین امپیل
	ت	۲۶	ان ٹیلین پریوبین
۳۶	تھیفورین	۲۶	ان ٹیلین کریم
۳۷	تھیفورین ٹنٹ	۲۵	انٹازولین
۳۶	تھیفورین اسٹیمٹ	۲۹	انکولان
۴۱	تھون زائی لائن	۳۲	ایول
۴۱	تھی ٹائلین	۳۳	ایوی لٹس

صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض
۲۰	گزیدگی حیوانات		ش
	ل	۱۸	شدید خراش
۳۲	لاشعاعی بیماری	۸۱	شری
	م	۸۲	شعبی دمہ
۳۰	متلی دق		ص
۳۷	مہال کی مکھی کا کاٹنا	۶۹	صدفیہ
۳۳	مخاطی التهاب قون		ط
۲۰	مور کی متلی	۳۱	طفحات دما
	ن		ع
۳۲	نار فازی	۸۲	عودتی صبی اذیا
۱۹	نزلہ و زکام	۳۱	صبی التهاب جلد
۳۲	نملہ نما التهاب جلد	۳۱	عودتی حرکی التهاب انف
	ہ		ف
۳۱	ہوائی متلی	۸۳	فالج لرزان
۸۳	ہشائین دوسر		و
۸۳	ہشائین صدمہ	۲۰	کار کی متلی
		۳۲	کونک کا اذیا
		۲۱	کھانسی
۳۲	یرقان کی خراش		گ
		۳۳	گلے پچھان



N		S	
Neo-Antergan	14	Sandozen Calcium	56
Neo-Hetramine	57	Saminon	57
		Servatol	37
P		.. Jelly	38
P B Z.	21	Stangen	37
Paraminyl	57	Stetomán	17
Paracarbinoxamine	57	Synogen	31
Perazil	56	.. Amp	31
Phenergan	19	.. Oment	31
.. Elixir	20	T	
.. Solution	20	Teldine	56
.. Cream	20	Totamon	21
Phenadyl	21	Thodactin	56
Phenindamine	37	Thonyline	57
Promethazine	19	Therphodis	34
Pyribenzamine	27	.. Oment	36
Pyronil	56	Therphocuritis	37
Pyrobutamine	12	Thomylaminat	37
Pyramal	57	Thyrogen	57
Pyrilamine	41	Tetameton	41
		Tetpeltamamine	22

اسماء	نام دوا	اسماء	نام دوا
۲۰	فرکان سویش	۵۱	مخفف مرکب
۲۱	فرکان کریم		ش
۲۲	فرکان دکورج	۲۲	فرکان پیر
۲۳	فرکان	۲۳	فرکان
	ج		د
۲۴	کدی سٹین	۲۴	فرکان پیتھان
۲۵	فرکان	۲۵	سٹین
۲۶	کدی	۲۶	فرکان پیتھان
۲۷	کدی	۲۷	فرکان
۲۸	کدی	۲۸	فرکان
۲۹	کدی	۲۹	فرکان
	م		فرکان
۳۰	کدی	۳۰	فرکان
۳۱	کدی	۳۱	فرکان
۳۲	کدی	۳۲	فرکان
۳۳	کدی	۳۳	فرکان
۳۴	کدی	۳۴	فرکان
۳۵	کدی	۳۵	فرکان
۳۶	کدی	۳۶	فرکان
۳۷	کدی	۳۷	فرکان
۳۸	کدی	۳۸	فرکان
۳۹	کدی	۳۹	فرکان
۴۰	کدی	۴۰	فرکان
۴۱	کدی	۴۱	فرکان
۴۲	کدی	۴۲	فرکان
۴۳	کدی	۴۳	فرکان
۴۴	کدی	۴۴	فرکان
۴۵	کدی	۴۵	فرکان
۴۶	کدی	۴۶	فرکان
۴۷	کدی	۴۷	فرکان
۴۸	کدی	۴۸	فرکان
۴۹	کدی	۴۹	فرکان
۵۰	کدی	۵۰	فرکان

حکیم علی ضیاء احمد



# INDEX

## Anti Histamine Therapy

<b>A</b>		Chlormethapyrilene	56
Ambodryl	56	Chlorphen Pyridamine	41
Ancholan	29	Chlorpromazine	56
Antazoline	25	Chlor Trimeton	41
Antergan	14	Clistine	57
Anthical	18	Coricidine	19
Anthisan	17	Cyclizine	56
„ Elixir		<b>D</b>	
„ Solution for injection	17	Decapryn	41½
Anthisan-cream	18	Diatrine	56
Antistine	25	Dibistin	26
Avil	32	Diparalene	56
Avillets	33	Diphenhydramine	23
Avil Eye Drops	34	Doxilamine	40
Avil ointment	34	Dramamine	45
Avil Powder	34	<b>F</b>	
<b>B</b>		F 929.	14
Benadryl Capsule	23	F 1571.	14
„ Syrup	24	<b>H</b>	
Benacine	51	Histadyl	42
Bonamine	56	Histantin	27
Bromodiphenyl Hydramine	56	Histo-Clopane	34
<b>C</b>		<b>M</b>	
Caloiluvine	39	Marezine	56
Caladhryl	44	Meclizin	56
Chlorcyclizine	27	Mepyramine Maleate	17
Chlorothene	56	Methapyrilene	56